

CONVENIO UNALM/IFEA/ORSTOM

ANEXO 5

SISTEMAS DE GANADERIA EXTENSIVA DE ALTURA EN LOS
ANDES CENTRALES DEL PERU

GILLES BRUNSWIG
AGRONOMO IFEA/ORSTOM

RESUMEN DE LA TESIS DE DOCTOR-INGENIERO AGRONOMO "SYSTEMES D'ELEVAGE EXTENSIF D'ALTITUDE
DANS LES ANDES CENTRALES DU PEROU", SUSTENTADA EL 22 DE ABRIL DE 1988, 510 P.

RESUME

Cette étude s'appuie sur une approche en termes de systèmes et une analyse comparée des grands types d'élevage identifiés.

Dans les Andes centrales, les troupeaux, composés de bovins dans la lande (sur le versant), à dominante ovine et comportant aussi des bovins ou des alpacas ou des lamas dans la puna, trouvent toute leur alimentation dans le pâturage.

On observe trois types de systèmes d'élevage extensif. Les troupeaux des agriculteurs (1 à 20 têtes), très peu surveillés, se déplacent entre la lande, les jachères et les terrains de culture après la récolte. Dans la puna, les troupeaux des éleveurs individuels (200 à 500 unités ovines), conduits de manière traditionnelle, effectuent peu de déplacements saisonniers; les troupeaux des coopératives issues des anciennes haciendas (plusieurs troupeaux, chacun de 800 à plus de 2000 unités ovines), bénéficient de techniques modernes, changent chaque semaine de pâturage et sont menés par des bergers salariés.

Dans la lande les systèmes d'élevage sont peu susceptibles de bénéficier d'importantes améliorations. En revanche, dans la puna, les systèmes d'élevage de type coopératifs peuvent fournir des éléments pour améliorer les systèmes d'élevage de type traditionnel.

Les bovins dans la lande, outre l'autoconsommation, permettent l'accès au numéraire en cas de besoin. Dans la puna, les ovins et les alpacas fournissent l'essentiel de la production de laine et de viande des systèmes d'élevage traditionnels et coopératifs. Les bovins et les lamas sont moins présents dans la puna car les bovins interviennent surtout dans l'autoconsommation et les lamas ne bénéficient pas de marchés porteurs.

Mots clefs: systèmes, élevage extensif, Andes, puna, versant, altitude, ovins, alpacas, lamas, bovins.

RESUMEN

Este estudio se apoya en un enfoque en términos de sistemas y en un análisis comparativo de los grandes tipos de ganadería que han sido identificados.

En los Andes centrales, los rebaños, que en el matorral bajo (en el vertiente) se componen de bovinos, y que en la puna están compuestos por ovinos y también bovinos o alpacas o llamas, basan toda su alimentación en el pastoreo.

Se observa tres tipos de sistemas de ganadería extensiva. Los rebaños de los agricultores (1 a 20 cabezas), con poco control, se desplazan entre el matorral bajo, el barbecho y el rastrojo. En la puna, los rebaños de los ganaderos individuales (200 a 500 unidades ovinas), conducidos a la manera tradicional, se desplazan poco de una temporada a la otra; los rebaños de las cooperativas nacidas de las antiguas haciendas (varios rebaños, cada uno de 800 a más de 2000 unidades ovinas), benefician de técnicas modernas, cambian semanalmente de canchada y son manejados por pastores asalariados.

En el matorral bajo, los sistemas ganaderos tienen pocas posibilidades de beneficiar de mejoramientos importantes. Por el contrario, en la puna, los sistemas ganaderos de tipo cooperativo pueden proveer elementos para mejorar los sistemas ganaderos de tipo tradicional.

En el matorral bajo, los bovinos, además del autoconsumo, permiten el acceso a la monetarización en caso de necesidad. En la puna, los ovinos y las alpacas proveen lo esencial de la producción de lana y carne de los sistemas ganaderos tradicionales y cooperativos. Los bovinos y las llamas son menos presentes en la puna puesto que los bovinos intervienen sobre todo en el autoconsumo y las llamas no benefician de una buena valorización mercantil.

Palabra clave: sistemas, ganadería extensiva, Andes, puna, vertiente, altura, ovinos, alpacas, llamas, bovinos.

CONVENIO UNALM/IFEA/ORSTOM
1986 - 1987

POLITICAS AGRARIAS Y ESTRATEGIAS
CAMPESINAS EN LA
CUENCA DEL CAÑETE

ANEXOS 1 A 7

LIMA - 1988