



LIGATURE DU CORDON OMBILICAL PAR UN  
BRACELET ELASTIQUE

Pr. André BRIEND  
(chercheur ORSTOM à l'ORANA,

*Note à la*  
Maternité de Guédiawayo  
*Janvier 1981.*

ORSTOM - DAKAR  
date: \_\_\_\_\_  
n°: \_\_\_\_\_

Fonds Documentaire ORSTOM



010016279

Fonds Documentaire ORSTOM

Cote: Bx 16279 Ex: 1

Après la naissance, le cordon ombilical se rétracte en séchant. Les méthodes usuelles de ligature à l'aide de fil ont l'inconvénient de ne serrer le cordon fermement que pendant quelques heures et laissent subsister un risque d'hémorragie. La ligature par bracelet élastique n'a pas ces inconvénients et est particulièrement facile à employer.

#### Description :

- 1°) Enfiler l'élastique sur la pince servant à clamer le cordon et sur passer un fil dans son ouverture (fig. a)
- 2°) Deux minutes après la naissance, clamer le cordon à l'aide d'une pince ainsi préparée,
- 3°) Couper le cordon au ras de la pince
- 4°) Faire passer l'élastique sur le cordon (fig. b), le faire glisser jusqu'à environ 1 cm de son insertion abdominale.
- 5°) Couper le cordon 1 cm au delà de la ligature (fig. c)
- 6°) Retirer le fil ayant servi à la mise en place de l'élastique (fig. d)

#### Quelques recommandations

- Préparez la pince et l'élastique à l'avance, avant de clamer le cordon

.../...

- Ne clampez pas le cordon immédiatement après la naissance .  
Attendre qu'il ait cessé de battre avant de le faire. Une quantité non négligeable de sang arrive au nouveau né de cette façon.  
Ne pas essayer d'accélérer ce transfert de sang en frottant le cordon.
- Prenez le cordon avec le bout de la pince : l'élastique sera plus facile à passer
- NE PAS COUPER LE CORDON TROP PRES DE L'ELASTIQUE

### Soins du cordon

#### NE RIEN FAIRE APRES LA FOSE DE L'ELASTIQUE

Fas de pansements ; le cordon sèche et tombe plus rapidement de cette façon.  
Les risques d'infection et d'hémorragie sont réduits sur un cordon sec .

Fas d'antiseptiques : il faut toucher le moins possible au cordon

Expliquer à la mère comment couvrir l'enfant avec du linge propre régulièrement changé .

Lui dire de ne rien mettre sur le cordon : les traitements traditionnels sont souvent dangereux .

Lui déconseiller de venir dans un dispensaire pour faire faire un pansement à l'enfant : les dispensaires sont des endroits où se rassemblent les mères ayant des enfants malades et où les risques d'infection croisée sont non négligeables .

Ne pas oublier de faire une injection de serum antitétanique .