

## Un nouveau *Paraguitelia* du Zaïre

(Col. *Cerambycidae Callichromini*)

PAR R. M. QUENTIN ET A. VILLIERS

(Laboratoire d'Entomologie du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris  
et O.R.S.T.O.M., Entomologie - Faunistique, 93 Bondy)

***Paraguitelia garambensis* n. sp.**

Longueur: 35 mm. — Figure 4.

Noir velouté, avec les parties rousses ou rougeâtres suivantes: les mandibules, sauf l'apex, les pattes, la moitié apicale des métépimères, le bord du sternite V, la presque totalité du tergite correspondant ainsi que les urites invaginés. Ailes bleu métallique avec la zone costale noir velouté.

Scape des antennes environ deux fois plus long que large au sommet, à côtés subparallèles et angle apical rostral avec une dent courte et relativement robuste; article III une fois et demie plus long que le scape; IV subégal au scape; V et les suivants de taille décroissante; III à V nettement plus étroits que le scape; III à X nettement dentés à l'angle apical rostral; XI un peu plus long que le X (60: 50), subcylindrique, en cône mousse à l'apex.

Clypéus faiblement saillant, le bourrelet continu, mais légèrement aplati au milieu. Tubercules antennaires, vus de face, légèrement obliques, étroitement séparés au milieu et surplombant faiblement le nodule articulaire du scape.

ZAÏRE: Parc National de la Garamba, Mission H, de Saeger, Pidigala, 23.IV.1952 (3327). Holotype ♀ au Musée Royal de l'Afrique Centrale.

26 NOV. 1963  
O. R. S. T. O. M. Fonds Documentaire

N° : 390/ex1  
Cote : B

25 JUIN 1979  
O. R. S. T. O. M.

Collection de Référence  
n° 3689




Fig. 1-4. — Genre *Paraguítelia* Quentin et Villiers, contour du pronotum. -  
 1. *P. problematica* Tippmann; - 2. *P. basilewskyi* Quentin et Villiers; -  
 3. *P. pinheyi* Quentin et Villiers; - 4. *P. garambensis* n. sp.

*Observation* : Les quatre espèces connues (uniquement par des femelles), se sépareront à l'aide du tableau suivant :

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Plus grande largeur du pronotum située en arrière du milieu (fig. 3) .....          | <i>P. pinheyi</i> Quent. et Vill.     |
| - Plus grande largeur du pronotum au milieu ou en avant du milieu (fig. 1, 2, 4) ..... | 2                                     |
| 2. Antennes, sauf le scape, entièrement rousses et ailes entièrement noires .....      | <i>L. problematica</i> Tipp.          |
| - Antennes entièrement ou en majeure partie noires .....                               | 3                                     |
| 3. Ailes rousses. Antennes noires avec la moitié apicale du scape rousse .....         | <i>P. basilewskyi</i> Quent. et Vill. |
| - Ailes bleu métallique. Antennes entièrement noires .....                             | <i>P. garambensis</i> n. sp.          |