

ETUDE COMPARATIVE DES FENETRES ET DES VERANDAS-PIEGES,
COMME MOYEN DE SORTIE POUR LES MOUSTIQUES,
EFFECTUEE AU VILLAGE DE KOUMBIA, DANS LA REGION DE
BOBO-DIOULASSO (HAUTE-VOLTA)
DE SEPTEMBRE 1962 à SEPTEMBRE 1964

par J.COZ⁺

Les cases-pièges, utilisées pour étudier le comportement des moustiques endophages et évaluer l'efficacité des insecticides, sont munies de trappes de sortie qui permettent de capturer les moustiques cherchant à sortir des habitations. Ces trappes de sortie sont essentiellement de deux types: les fenêtres-pièges (Muirhead Thomson 1947, 1950, 1968; Hadaway 1950; Davidson 1953; Gillies et al., 1961; Smith 1964) et les vérandas (Gillies et al. 1961; Coz et al. 1965, 1966; Smith 1965).

Dans le cadre d'une étude sur l'activité de deux dosages de DDT, de Septembre 1962 à Septembre 1964, sur les moustiques (Coz et al. 1965), nous avons comparé les deux différents types de sortie. Les résultats présentés sont ceux obtenus dans les habitations témoins qui se composaient de trois maisons de deux pièces; trois chambres étaient munies de vérandas, les autres de fenêtres-pièges.

Les cases-pièges étaient construites suivant le type Bobo qui est le plus couramment répandu dans cette partie de la Haute-Volta: ce sont des habitations dont les murs sont faits de briques de terre séchées au soleil et le toit de branches recouvertes de terre (loc.cit.).

O. R. S. T. O. M.

Collection de Référence

n° B4553

⁺ Pharmacien Chimiste des Armées, Entomologiste médical O.R.S.T.O.M.

Méthode

Le matin, les moustiques étaient capturés à la main dans les pièges:
- à 5 h 30 GMT, ce qui correspond au lever du jour, pratiquement toute l'année,
- à 8 h 30 pour les sorties tardives.
- Enfin à 10 h 30, il était procédé à un ramassage aussi soigneux que possible dans les habitations elles-mêmes. Dans chaque chambre dormait un homme sauf pour la chambre n°10 qui n'a été employée que de Juillet 1963 à Septembre 1964.

Chaque maison était constituée de deux pièces, une avec veranda, l'autre avec fenêtre-piège; les chambres étaient numérotées 2,9,13 avec piège fenêtre, 1,10,14 avec veranda. Chaque chambre était munie de deux fentes d'entrée identiques (loc.cit.).

Les captures avaient lieu trois ou quatre jours consécutifs chaque semaine.

Principales espèces resencées (Tableaux 1 et 2)

Les espèces pour lesquelles un nombre suffisant d'exemplaires a été capturé sont:

- Anopheles gambiae (sensu lato) Giles
- Anopheles funestus Giles
- Anopheles nili Theobald
- Mansonia uniformis Theo.
- Mansonia africana Theo.

Par A.gambiae (s.l.), il faut entendre vraisemblablement un mélange des espèces A et B d'eau douce (Davidson et Jackson 1962). Une étude récente effectuée au village de Koumbia nous a donné en Juillet 1969, 65 déterminations d'espèce A pour 11 déterminations d'espèce B, au mois d'Août 52 A contre 9 B.

A.funestus n'a été rencontré que sous sa forme typique.

Résultats - femelles à jeun.

Que les espèces soient endophiles ou exophiles, il se produit (tableaux 3 et 4) une sortie importante des femelles à jeun aux premières heures de l'aube; globalement le phénomène est le même dans les habitations

avec véranda que dans celles avec trappe-fenêtre, mais l'échelonnement des sorties, dans le temps, est différent pour les deux types de pièges. Ainsi pour A.funestus, on ne trouve à 5 h 30 que 54,11% dans les fenêtres-pièges, alors que l'on capture 73,80% dans les vérandas; pour A.gambiae, on ne

le pourcentage des moustiques pris à la main dans les habitations Bobo, de même type sensiblement que celles que nous avons construites. Hamon et al (1965) avaient estimé que la capture à la main permettait de récolter 68% des A.funestus et 35% des A.gambiae dans les habitations de Dori (Haute-Volta). Cox et al (1966) en forêt estimaient à 30% de la population anophélienne

Dans un souci de standardisation, nous avons comparé deux types de cases-pièges, celles avec vérandas et celles avec pièges-fenêtres. Les dernières sont plus maniables; il est possible d'envisager en effet de changer les fenêtres-pièges plusieurs fois par jour, mais elles présentent à notre avis l'inconvénient de retarder la sortie des moustiques, ce qui peut amener à tirer des conclusions trop optimistes. Dans le cas de traitement insecticide, le retard à sortir entraîne pour le moustique un plus grand contact avec le produit toxique et par voie de conséquence une mortalité plus importante.

RESUME

De septembre 1962 à Septembre 1964, l'auteur a étudié le comportement de moustiques endophages dans 6 chambres munies de fenêtre ou de véranda-piège. A.funestus paraît être l'espèce la plus endophile suivie d'A.gambiae s.l. Trois espèces exophiles, A.nili, M.uniformis et M.africana ont aussi été étudiées. On remarque que les fenêtres-pièges échelonnent la sortie des moustiques.

Pour A.funestus et A.gambiae, il y a lieu de noter l'importance de l'état de réplétion sur le comportement; si les femelles gorgées sont en partie à caractère endophile, les moustiques à jeun fuient délibérément les maisons.

SUMMARY

From September 1962 to September 1964, the author has studied the behaviour of endophagous mosquitoes in 6 rooms supplied with window or veranda-trap. A.funestus seems to be the more endophilic species followed by A.gambiae. Three exophilic species, A.nili, M.uniformis, M.africana have also been studied.

For A.funestus and A.gambiae, we must note the importance of feeding: if the fed females are in part endophilic, the unfed mosquitoes look for going out of the houses. It is observed that the window-traps slow the exit of mosquitoes.

BIBLIOGRAPHIE

- CHOUMARA (R.), HAMON (J.), BAILLY (H.), ADAM (J.P.) et RICOSSE (J.H.), 1959.-
Le paludisme dans la zone pilote de Bobo-Dioulasso, Haute-Volta.
Cahiers ORSTOM, PARIS, 1959, 1, 123 pp.
- COZ (J.), EYRAUD (M.), VENARD (P.), ATTIOU (B.), SOMDA (D.) et OUEDRAOGO (V.),
1965.- Expériences en Haute-Volta sur l'utilisation de cases-pièges pour
la mesure de l'activité du DDT contre les moustiques.
Bull.Org.mond.Santé, 33, 435.
- COZ (J.), HAMON (J.), SALES (S.), EYRAUD (M.), BRENGUES (J.) et SUBRA (R.),
1966.- Etudes entomologiques sur la transmission du paludisme humain dans
une zone de forêt humide dense, la région de Sassandra, République de
Côte d'Ivoire.
Cah.ORSTOM, Sér.Ent.méd., 7, 13
- COZ (J.), SMITH (A.), PANT (C.P.) et HAMON (J.), 1969.- Evaluation de nouveaux
insecticides en Afrique tropicale.
Cah.ORSTOM., Sér.Ent.med.et Parasit., 7, 129
- DAVIDSON (G.), 1953.- Experiments on the effect of residual insecticides in
houses against Anopheles gambiae and A.funestus.
Bull.ent.Res., 44, 231
- DAVIDSON (G.) and JACKSON (C.E.), 1962.- Incipient speciation in Anopheles
gambiae Giles.
Bull.Org.mond.Santé, 27, 303
- GILLIES (M.T.), HAMON (J.), DAVIDSON (G.) de MEILLON (B.) et MATTINGLY (P.F.),
1961.- Guide d'Entomologie appliquée à la lutte antipaludique dans la
région africaine de l'OMS, Brazzaville.

- HADAWAY (A.B.), 1950.- Observations on mosquito behaviour in native huts
Bull.ent.Res., 41, 63
- HAMON (J.), COZ (J.), SALES (S.) et OUEDRAOGO (C.S.), 1965.- Etudes entomologiques sur la transmission du paludisme humain dans une zone de steppe boisée, la région de Dori (République de Haute-Volta)
Bull.I.F.A.N., 27, 1115.
- MUIRHEAD-THOMSON (R.C.), 1947.- The effects of house spraying with pyrethrin and with DDT on Anopheles gambiae and A.melas in West Africa.
Bull.ent.Res., 38, 449
- MUIRHEAD-THOMSON (R.C.), 1950.- DDT and gammexane as residual insecticides against Anopheles gambiae.
Trans.Roy.Soc.trop.Med.Hyg., 43, 401

TABLEAU N° 1

Etude des sorties des cases-pièges munies de vérandas, il n'est pas tenu compte de l'état physiologique des moustiques.

ESPECES	N° des pièces	5h30		8h30		Reste		TOTAL
		N	%	N	%	N	%	
<u>A.funestus</u>	1	1.902	51,11	335	9,00	1.484	39,88	3.721
	10 ⁺⁺	114	12,96	98	11,14	667	75,88	879
	14	461	30,91	97	6,50	933	62,57	1.491
<u>A.gambiae</u>	1	147	40,38	20	5,49	197	54,12	364
	10	70	23,80	35	11,90	189	64,28	294
	14	121	48,01	27	10,71	104	41,26	252
<u>A.nili</u>	1	46	83,63	2	3,63	7	12,72	55
	10	5	23,08	0	-	1	-	6
	14	12	50,00	0	-	3	-	15
<u>M.uniformis</u>	1	250	82,78	40	13,24	12	3,97	302
	10	110	75,86	32	22,06	3	2,06	145
	14	198	91,24	11	5,06	8	3,68	217
<u>M.africana</u>	1	102	79,06	15	11,62	12	9,30	129
	10	64	82,05	12	15,38	2	2,56	78
	14	121	96,80	4	3,20	0	0	125

++ La chambre 10 n'a été utilisée que de Juillet 1963 à Septembre 1964.

TABLEAU N° 2

Etude des sorties des cases-pièges munies de trappes fenêtrées; il n'est pas tenu compte de l'état physiologique des moustiques.

ESPECES	N° des pièces	5h30		8h30		Reste		TOTAL
		N	%	N	%	N	%	
<u>A.funestus</u>	2	243	28,72	211	24,94	392	46,33	846
	9	619	26,14	411	17,35	1.338	56,50	2.368
	13	214	13,00	158	9,60	1.273	77,38	1.645
<u>A.gambiae</u>	2	37	20,78	50	28,08	91	51,12	178
	9	63	15,32	78	18,97	270	65,69	411
	13	92	26,97	76	22,28	173	50,73	341
<u>A.nili</u>	2	2	6,66	1	3,33	0	-	3
	9	10	11,11	2	2,22	1	-	13
	13	5	6,25	1	1,25	4	-	10
<u>M.uniformis</u>	2	44	48,35	36	39,56	11	12,08	91
	9	180	57,50	106	33,86	27	8,62	313
	13	89	57,41	54	34,83	12	7,74	155
<u>M.africana</u>	2	24	48,00	20	40,00	6	12,00	50
	9	65	61,90	34	32,38	6	5,71	105
	13	76	64,40	32	27,11	10	8,47	118

TABLEAU N°3

Etude des sorties des moustiques des cases-pièges témoins munies de trappes-fenêtres, toutes pièces groupées.

ESPECES	Etat physiolo- gique	Heure de sortie				Reliquat		TOTAL
		5h30		8h30		N.	%	
		N.	%	N.	%			
<i>A.funestus</i>	à jeun	448	54,11	209	25,24	171	20,65	828
	gorgés	447	12,86	460	13,24	2.568	73,90	3.475
	gravides	181	32,56	111	19,96	264	47,48	556
<i>A.gambiae</i>	à jeun	28	41,8	24	35,8	15	22,4	67
	gorgés	119	16,15	142	19,27	476	64,59	737
	gravides	45	35,71	38	30,16	43	34,13	126
<i>A.nili</i>	à jeun	2	-	2	-	0	-	4
	gorgés	14	66,7	2	9,5	5	23,8	21
	gravides	1	-	0	-	0	-	1
<i>M.uniformis</i>	à jeun	99	61,49	53	32,92	9	5,59	161
	gorgés	214	53,77	143	35,93	41	10,30	398
	gravides	0	-	0	-	0	-	0
<i>M.africana</i>	à jeun	24	72,73	7	21,21	2	6,06	33
	gorgés	141	58,75	79	32,92	20	8,33	240
	gravides	0	-	0	-	0	-	0

TABLEAU N°4

Etude des sorties des moustiques des cases-pièges témoins, munies de vérandas, toutes pièces groupées.

ESPECES	Etat	Heure de sortie				Reliquat		TOTAL
		5h30		8h30		N	%	
		N	%	N	%			
<u>A.funestus</u>	à jeun	1 380	73,80	105	5,61	385	20,59	1.870
	gorgés	904	24,73	376	10,28	2.376	64,99	3.656
	gravides	193	34,16	49	8,67	323	57,17	565
<u>A.gambiae</u>	à jeun	55	77,5	6	8,5	10	14,1	71
	gorgés	243	32,93	69	9,35	426	57,72	738
	gravides	40	39,6	7	6,93	54	53,47	101
<u>A.nili</u>	à jeun	16	-	0	-	1	-	17
	gorgés	47	79,7	2	3,4	10	16,9	59
	gravides	0	-	0	-	0	-	0
<u>M.uniformis</u>	à jeun	152	90,48	11	6,55	5	2,98	168
	gorgés	406	81,86	72	14,52	18	3,63	496
	gravides	0	-	0	-	0	-	0
<u>M.Africana</u>	à jeun	53	86,9	7	11,5	1	1,7	61
	gorgés	234	86,35	24	8,86	13	4,80	271
	gravides	0	-	0	-	0	-	0