

ENTOMOLOGIE SYSTÉMATIQUE

Un nouveau Parandrinae de Madagascar

[COL. CERAMBYCIDAE]

par R. Michel QUENTIN et André VILLIERS

Aucun *Parandrinae* n'était jusqu'ici connu de Madagascar et, seul, le commun *Parandra gabonica* Thomson a été signalé des Comores. Nous décrivons plus loin un nouveau *Stenandra* récolté dans la Grande Ile par le regretté Jean VADON.

LAMEERE (1912) a créé le sous-genre *Stenandra* pour son espèce africaine *P. kolbei* Lameere, 1903. Dans sa diagnose LAMEERE insistait sur les caractéristiques très particulières de ce sous-genre et, de fait, nous pensons qu'elles justifient amplement de l'élever au rang de genre, dont nous donnons ci-dessous un bref synopsis.

Genre *Stenandra* Lameere

Parandra subgen. *Stenandra* Lameere, 1912, *Mém. Soc. ent. Belg.*, 21, p. 114 (Révision, p. 978) ; espèce-type du sous-genre : *Parandra kolbei* Lameere (Afrique centrale).

Parandra subgen. *Stenandra* ; Lameere, 1919, in WYTSMAN, *Gen. Ins.*, 172, p. 15 et 18.

Parandra subgen. *Stenandra* ; Gilmour, 1956, *Longicornia*, 3, p. 8.

Voisin de *Parandra*, en diffère par les caractères suivants :

— mandibules du mâle falciformes, écartées l'une de l'autre à la base, dentées au bord interne, bidentées à l'apex, concaves dessus et dessous.

— articles III à XI des antennes avec une grande fossette porifère divisée en deux par une forte carène longitudinale.

— cavités cotyloïdes antérieures fermées en arrière (proépimères subcontigus à la saillie prosternale).

— pas de bourrelet entre la gula et le mentum.

Répartition géographique : Afrique intertropicale et Madagascar. Deux espèces :

TABLEAU DES ESPÈCES

1. Tête transverse. Lobe supérieur des yeux étroit et subcontigu à la base de l'antenne (canthus oculaire presque nul). Afrique ... 1. *S. kolbei* (Lameere)
- Tête subcarrée. Lobe supérieur des yeux large, nettement séparé de la base de l'antenne (canthus oculaire égal à la moitié du lobe supérieur de l'œil). Madagascar 2. *S. vadoni* n. sp.

1. *Stenandra kolbei* (Lameere)

Parandra kolbei Lameere, 1903, *Ann. Mus. Congo, Zool.*, sér. 3, 1, *Prioninae*, 2, fasc. 1, p. 6 ; holotype ♂ : Niam-Niam (Musée de Berlin).

Parandra (Stenandra) kolbei ; Lameere, 1912, *Mém. Soc. ent. Belg.*, 21, p. 114 et 116 (Révision, p. 978 et 980)

Parandra (Stenandra) kolbei ; Lameere, 1913, in JUNK, *Col. Cat.*, 52, p. 7.

Parandra (Stenandra) kolbei ; Lameere, 1919, in WYTSMAN, *Gen. Ins.*, 172, p. 18.

Parandra (Stenandra) kolbei ; Gilmour, 1956, *Longicornia*, 3, p. 8.

Stenandra kolbei ; Villiers, 1966, *Bull. Inst. fond. Afr. noire*, sér. A, 28 (3), p. 1220.

Répartition géographique :

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE : région du Mont Nimba, Ziéla, 20-III-1957 (*M. Lamotte, J. L. Amiet, P. Vanderplaetsen*).

CÔTE D'IVOIRE : sans précision (*G. Melou*).

CAMEROUN : Makak, 500 m, 1939 (*P. Lepesme, R. Paulian et A. Villiers*) ; Victoria. Nkolbisson, près de Yaoundé, III-1966, IV-1965, IV-1967, IV-1970 (*Ph. Bruneau de Miré*).

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : Semio (*Bohndorff*) ; Mbaiki (distr. Fidaou), 1919 (*Pitard*).

GABON : Muni, Monts de Cristal, 400 m, 15/31-X-1969 (*A. Villiers*).

RÉPUBLIQUE DU CONGO : Mbila, Monts du Chaillu, XII-1963 (*A. Descarpentries et A. Villiers*).

MOZAMBIQUE : Beira, XII-1928 (*P. Lesne*).

2. *Stenandra vadoni* n. sp.

Longeur : 17 mm (y compris les mandibules).

Mâle : Brun rouge, luisant ; antennes, mandibules, genoux, marges du pronotum et suture élytrale brun de poix.

Tête subcarrée, peu convexe ; lobe supérieur des yeux large, nettement séparé de la base de l'antenne ; saillie antennaire presque nulle ; dent médiane du labre forte. Antennes courtes, n'atteignant pas la base du pronotum ; scape cylindro-conique, aussi long que large ; pédicelle plus de deux fois plus large que long ; III aussi long que le scape, subconvexe ; articles III à X s'aplatissant et croissant progressivement, un peu plus larges à l'apex qu'à la base, leur angle apical-rostral bien marqué, tendant à devenir dentiforme vers l'apex ; XI acuminé à l'apex, environ une fois et demie plus long que le X, assez déprimé longitudinalement.

Pronotum très légèrement transverse, un peu plus étroit à la base qu'au bord collaire, avec les marges basale et latérales finement rebordées ; angles antérieurs en dent obtuse surbaissée ; côtés sinueux juste après le milieu. Elytres subparallèles, étroitement rebordés, à angle huméral net ; disque avec deux côtes très obsolètes, effacées au tiers apical. Angle suturales arrondis séparément.

Répartition géographique : Madagascar Est ; Maroantsetra, 26-XII-1966 (*J. Vadon*) (Muséum, Paris, holotype ♂).

(Laboratoire d'Entomologie du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, Entomologie-Faunistique, ORSTOM, Bondy).

4

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

EXTRAIT

13 FEV. 1973

O. R. S. T. O. M.

Collection de Référence

n° 5932 Entom.