

Phyzt

XIPHINEMA VUITTENEZI N. SP. (NEMATODA: DORYLAIMIDAE)

PAR

MICHEL LUC, [M. B. LIMA¹), B. WEISCHER ET J. J. M. FLEGG²]

Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Abidjan, Côte d'Ivoire; Rothamsted Experimental Station, Harpenden (Herts.), Angleterre; Biologische Bundesanstalt, Institut für Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung, Münster (Westf.), Allemagne et Imperial College Field Station, Sunninghill, Ascot, Berks., Angleterre, respectivement.

Cinq populations venant d'Europe et une population des U.S.A. appartenant à *Xiphinema vuittenezi* n. sp. sont étudiées. Cette nouvelle espèce est caractérisée par une queue arrondie portant un faible mucron distal, la vulve située à moitié du corps environ, la présence de deux ovaires, la forme de la partie antérieure du corps et le profil de la région labiale; les mâles sont rares.

S'il est fréquent que deux nématologistes s'associent pour décrire une nouvelle espèce, trois sont rares et c'est à notre connaissance la première fois que quatre auteurs se trouvent collaborer à une même description. Ceci nécessite une explication.

Les quatre auteurs travaillaient séparément à la description d'un nouveau *Xiphinema*: l'un (B.W.) en Allemagne sur une population venant de vignobles de la région rhénane, un autre (M.L.) en Côte d'Ivoire sur une population venant de vignobles d'Alsace envoyée par A. Vuittenez, un autre (M.B.L.), à Rothamsted sur une population venant de canne à sucre du Portugal, enfin le dernier (J.J.M.F.) à l'Imperial College, sur des individus provenant de cognassiers d'East Malling. Grâce, en partie, à l'intermédiaire d'autres nématologistes, les Drs. Goodey et Sturhan et M. Vuittenez, les quatre nématologistes entrèrent en contact, et par des échanges de dessins, mesures et specimens se convainquirent qu'ils travaillaient sur la même espèce. Ils décidèrent alors de fondre leurs travaux dans une publication commune.

Ces faits prouvent que devant l'augmentation du nombre des nématologistes et singulièrement des systématiciens, des contacts fréquents entre spécialistes des mêmes genres ou des mêmes groupes de genres sont indispensables. Les relations entre quatre nématologistes de nationalités différentes travaillant dans des organismes différents ont remplacé ainsi une concurrence involontaire stérile par une collaboration fructueuse pour chacun d'entre eux, en même temps qu'elles ont permis une étude systématique beaucoup plus complète.

1) Calouste Gulbenkian Research Fellow from the Estação Agronómica Nacional, Oeiras, Portugal.
2) Now at East Malling Research Station, Maidstone, Kent, Angleterre.

66 12152

2000000 2000000 1964

Cette nouvelle espèce est dédiée à M. A. Vuittenez, qui le premier a publié des données biométriques et des microphotos permettant de la différencier (Vuittenez, 1962).

XIPHINEMA VUITTENEZI N. SP.

- = *Xiphinema* sp. in Weischer, 1960
- = *Xiphinema* sp. type II, in Vuittenez, 1962
- = *Xiphinema* sp. in Lima, 1962
- = *Xiphinema* sp. in Sturhan, 1963

Dimensions: les caractéristiques biométriques des différentes populations sont données pour les femelles dans le Tableau I, pour les mâles dans le Tableau II et pour les juvéniles dans le Tableau III auxquels nous renvoyons.

Holotype (population Guntersblum): femelle: L: 3,42 mm. a: 69,0. b: 8,7. c: 97,7. V: 17,0 48,9 18,2. Stylet: 127 + 79 = 206 μ . Lq/da¹): 0,9.

Allotype (population Guntersblum): mâle: L: 3,08 mm. a: 68,9. b: 8,7. c: 85,6. T: 61,5. Stylet: 131 + 72 = 203 μ , Lq/da¹): 0,9.

Description: (Sauf mention spéciale, la description s'applique à la population Guntersblum, considérée comme la population-type).

Femelles: Sur animaux tués lentement par la chaleur, habitus recourbé en C plus ou moins ouvert. Corps graduellement aminci vers l'avant, à partir du niveau de la jonction oesophago-intestinale environ (Fig. 1, A), beaucoup plus brusquement rétréci à la partie postérieure (Fig. 1, F; Fig. 2, A-F).

Cuticule épaisse de 3 μ environ au milieu du corps et composée de trois couches: une couche hyaline externe très réfringente, mince (0,75 μ), une couche médiane apparaissant jaunâtre, plus épaisse (1,5 μ), enfin une couche interne, hyaline et mince (0,75 μ). La cuticule est épaissie dans la région cervicale (5 μ) et surtout dans la région médiane et postérieure de la queue où elle peut atteindre jusqu'à 15 μ . C'est sur la couche interne de la cuticule que porte cet épaississement; sur la queue, cette couche se subdivise en trois zones: deux zones minces externes et une interne, épaisse, striée radialement. La cuticule est très finement striée transversalement en surface, mais cette striation n'est visible qu'à la partie postérieure du corps; sur la queue, cette striation fait place à deux striations obliques contrariées.

Le champ latéral, non différencié sur la cuticule elle-même, et visible seulement par la corde latérale sous-jacente est, au milieu du corps, large d'environ $\frac{1}{4}$ du diamètre correspondant. Pores cervicaux présents et comprenant quatre files de trois à quatre pores: une file ventrale, une file dorsale et deux files latérales; les files latérales se prolongent vers l'arrière et viennent border subdorsalement la corde latérale à partir d'un niveau un peu postérieur à la base du stylet et se prolongent sur tout le corps en une ligne de pores latéro-subdorsaux; cette ligne se double dans la partie postérieure du corps d'une ligne de pores latéro-subventraux. Les pores ventraux sont également présents sur toute la longueur du corps.

¹) Lq/da: longueur de la queue divisée par le diamètre du corps au niveau de l'anus.

Errata dans Luc et al. (1964)

Xiphinema vuittenezi n.sp. (Nematoda: Dorylaimidae)

Nematologica 10, 151-163

p. 154, Tableau I :

"Lauenstein (Vuittenez, 1962)" doit être classé sous "France" au lieu de

sous "Deutschland".

L'entête "Aigues-Mortes" concerne seulement la cinquième colonne de chiffres
"(Vuittenez, 1962)".

En effet, la quatrième colonne de chiffres "(orig.)" se rapporte, ainsi que
la troisième "(Vuittenez, 1962)", à l'entête "Lauenstein".

p. 156, ligne 23 :

"Vulve consistant en une fente transverse, vagin profond d'une moitié"

Lèvres soudées à profil arrondi vers l'avant, puis droit sur quelques μ , marquant une séparation nette avant l'élargissement graduel du corps (Fig. 1, B; Fig. 3, A, B). Amphides en forme d'étrier renversé, à ouverture large (2/3 à 3/4 du diamètre correspondant) située à 2,5-3 μ de l'avant. Poche amphidienne contenant des fibrilles en peloton bien visible en vue dorso-ventrale (Fig. 1, B, C; Fig. 3, A).




TABLEAU I *Caractéristiques biométriques des femelles de Xiphinema vuittenezi n. sp.*

| | <i>Deutschland</i> | | | <i>France</i> | | | <i>England</i> | <i>Portugal</i> | <i>U.S.A.</i> |
|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Hersbruck (Sturhan 1963) | Guntersblum (orig.) | Lauenstein (Vuittenez 1962) | Aigues-Mortes (orig.) | Narbonne- Plage (orig.) | East Malling (orig.) | Lisboa (orig.) | Davis (orig.) | |
| n | 7 | 35 | 9 | 31 | 6 | 3 | 50 | 19 | 3 |
| L mm | (3,35) | (3,24) | (3,28) | (3,28) | (3,39) | (3,04) | (3,26) | (3,13) | (3,15) |
| a | 2,88-3,59 (62) | 2,66-3,84 (66) | (68,9) | 3,00-3,56 (70,2) | (64,0) | 2,87-3,41 (63,2) | 2,84-3,78 (61,1) | 2,63-3,53 (62,3) | 3,11-3,20 — |
| b | 53,5-64,5 (7,1) | 57-79 (7,0) | (6,8) | 62-80,7 (7,3) | (7,9) | 58-69 (6,9) | 50-70 (6,6) | 55-69 (6,9) | (7,2) |
| c | 6,1-7,7 (84,5) | 5,7-9,0 (93) | (100) | 6,4-8,4 (91,3) | (99,7) | 6,3-7,3 (118) | 5,7-7,9 (92,2) | 5,4-8,1 (93,0) | 7,1-7,3 (100,7) |
| V | 67-91 (50,2) | 70-120 (50,3) | (50,4) | 79,2-118 (51,0) | (50,1) | 104-139 (47,1) | 75-105 (50,9) | 75-114 (49,4) | 98-106 (49,5) |
| Gonade antérieure | 49,4-51,9 — | 46-55 (14,5) | — | 49,3-56,6 (18,1) a | — | 46,9-47,8 (17,6) | 48,5-53 (13) a | 47-51 (13,5) | 48-51 — |
| Gonade postérieure | — | 13-17 (15) | — | 13,4-20,7 (19,5) a | — | 16-21 (18,0) | 11-15 (13) a | 12-15 (13,8) | — |
| Odontostyle | (127,5) | 12-18 (131) | (124) | 13,6-25,7 (129,5) | (129) | 16-22 (130) | 9-15 (130) | 12-16 (127) | (122,2) |
| Partie basale du stylet | 124-131 (76) | 124-135 (74) | — | 121-137 (75,1) | — | 128-133 (76) | 124-134 (75,2) b | 115-132 (69,7) | 121-124 (71,3) |
| Stylet (longueur totale) | 69-79,5 (203,5) | 65-82 (206) | (202) | 72-78 (204,6) | (206) | 75-77 (207) | 66-80 (205,2) b | 61-75 (196,6) | 70-73 (193,5) |
| Guide | 195-210,5 — | 192-211 4-24 | — | 195-212 7-39 a | — | 203-210 (-2)-17 | 196-212 — | 183-204 11-42 | 193-194 12-15 |
| Distance de la base du guide à l'avant | (115,5) | (113) | — | (106) a | — | (108) | (124) b | (105) | (106) |
| Longueur de la queue (Lq) | 110-121 — | 105-124 (34) | — | 88-123 (36,1) | — | 105-113 (25,5) | 111-133 (35,2) | 89-120 (33,8) | 101-109 (31,3) |
| Diamètre anal (da) | 28-42 (40) | 30-41 (38) | — | 28-42 (35,6) | — | 25-28 (33) | 31-40 (38) | 28-38 (35,5) | 30-33 (36,7) |
| Lq/da | 37-43 — | 35-42 (0,95) | — | 32-39 (0,99) | — | 31-34 (0,78) | 34-43 (0,91) | 32-40 (0,96) | 35-38 (0,85) |
| Mucron caudal | 0,8-1,1 (2,7) | 0,8-1,1 (2,7) | — | 0,81-1,10 (3,2) a | — | 0,7-0,9 (1,8) | 0,8-1,2 (3,2) c | 0,77-1,13 (3,4) | 0,79-0,89 (3,4) |
| Largeur des lèvres (à la base) | 2,5-4,5 — | 0-4,4 (14) | — | 2-6 (14,1) | — | 0-2,5 (14) | 0-5 — | 0-4,5 (14) | 3,0-4,0 (13,8) |
| Hauteur des lèvres | — | 13,5-16 | — | 13-15 (7,3) | — | 13-15 | — | 13-15 (6,6) | 13,7-13,8 (7,2) |
| Diamètre au niveau de la vulve | — | — | — | 6,2-8,0 (47) a | — | 6 (48) | — (53,4) | 5,5-7,1 (50) | 7,0-7,5 — |

a: 20 ♀ ♀

a: 33 ♀ ♀

b: 49 ♀ ♀

c: 48 ♀ ♀

TABLEAU II
Caractéristiques biométriques des mâles de Xiphinema vuittenezi n. sp.

| | Guntersblum | Narbonne-Plage | East-Malling | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|-----|
| n | 1 | 4 | 4 | |
| L mm | 3,08 | (3,15) 2,81-3,29 | (3,29) 3,20-3,41 | |
| a | 68,5 | (69,5) 57,9-78,3 | (62,7) 55,5-69,6 | |
| b | 8,7 | (7,1) 6,7-7,7 | (6,5) 6,1-7,1 | |
| c | 85,6 | (87,8) 80,4-93,9 | (92,4) 85,3-96,5 | |
| T | 61,5 | (56,1) 48,3-64,2 | (50,8) 48-55,0 | |
| Odontostyle | 131 | (134) 126-141 | (125) 117-130 | |
| Partie basale du stylet | 72 | (78) 76-79 | (74) 72-79 | |
| Stylet (longueur totale) | 203 | (211) 202-221 | (199) 193-204 | |
| Guide | 8 | 7-28 | — | |
| Distance de la base du guide à l'avant | 119 | (114) 103-125 | (118) 110-124 | |
| Longueur de la queue (Lq) | 36 | (38) 35-40 | (38) 34-40 | |
| Diamètre anal (da) | 38 | (36) 35-37 | (41) 40-43 | |
| Lq/da | 0,9 | (1,00) 0,97-1,07 | (0,84) 0,8-0,9 | |
| Mucron caudal | 2 | (2,8) 2-3 | (3) 2-4 | a |
| Spicules | 58 | (60,5) 58-62 | (61,3) 59,5-62 | a |
| Pièce accessoire | 15 | (15,5) 15-16,5 | (16,8) 16,5-17,5 | a |
| Dist. anus pap. préanales | 15 | (17) 15-19 | (21,5) 20-24,5 | a |
| Nombre de suppléments | 5 | 4-6 | 4-5 | a |
| Dist. pap. préanales — 1e supplément | 46 | (51) 42-65 | (81,5) 74-85 | a |
| Dist. 1e suppl.-2e suppl. | 29 | (40) 36-46 | (34,0) 29-38 | a |
| Dist. 2e suppl.-3e suppl. | 31 | (44) 33-51 | (31,6) 30-34 | a |
| Dist. 3e suppl.-4e suppl. | 29 | (33) 23-46 | (32,0) 30-34 | a |
| Dist. 4e suppl.-5e suppl. | 29 | (30,5) 25-34,5 | 22 | a c |
| Dist. 5e suppl.-6e suppl. | — | 28 | | b |
| Largeur labiale | 14 | (14,6) 14-15 | (14,5) 14-15 | b |
| Hauteur labiale | 6 | (5,8) 5-6 | 6 | b |
| Diamètre au milieu du corps | 45 | (45,5) 42-48,5 | (53) 51-59 | |
| | | a : 3 ♂ ♂ | a : 3 ♂ ♂ | |
| | | b : 1 ♂ | b : 2 ♂ ♂ | |
| | | | c : 1 ♂ | |

Stylet typique du genre: partie basale possédant des ailettes bien développées, à marges renforcées, larges de 13-14 μ [pop. Lisboa: 10,5-13 μ]. Guide tubulaire de longueur très variable suivant que le stylet est rentré ou sorti; anneau basal du guide épaissi.

Hémizonide aplati très réfringent, large de 6-8 μ et situé à 190-220 μ de l'avant, ou 5,2-6,7% de la longueur du corps [pop. Lauenstein 206-224 μ ou 5,5-6,9%]. Hémizonion non visible sur tous les individus, lenticulaire, large de 2,5-3,5 μ et situé à 230-270 μ de l'avant ou 8,2 à 8,4% [pop. Lauenstein: 260-267 ou 8-8,2 %]. Anneau nerveux [pop. Lisboa] entourant l'oesophage, en position très variable par rapport à la base du stylet (9,5-92 μ). Il existe un second anneau nerveux (Goodey & Hooper, 1963), plus petit que le précédent, probablement en relation avec l'hémizonion.

Partie antérieure de l'oesophage cylindrique mince, parfois enroulée sur elle-même; bulbe basal musculéux, long de 109 à 126 μ (118 μ) et large de 18 à 23 μ (20,5 μ); noyaux de la glande oesophagienne dorsale situés près de l'extrémité antérieure du bulbe [pop. Lisboa]. Pièce chitinisée ("mucron") noyée dans la paroi musculaire de la portion amincie de l'oesophage, de forme variable, en général en pointe de flèche dirigée vers l'avant ou plus rarement vers l'arrière et située à 28-87 μ de la base du stylet [pop. Lisboa: 31 à 94 μ] (Fig. 1, A).

Cardia conique à cellules moyennement développées, en relief dans la lumière de l'intestin.

Cellules intestinales: les cellules de la paroi de l'intestin ont une longueur de 11-15 μ . Les cellules

à la partie médiane et postérieure de la queue (jusqu'à 15μ). Pores caudaux (Fig. 1, E, F; Fig. 2, A-F): une paire de pores en position latérale située à hauteur du quart ou du tiers postérieur, une paire subdorsale à latérodorsale, généralement située à hauteur de la moitié de la queue; une paire de pores adanaux située un peu au-dessus ou un peu au-dessous du niveau de l'anus, en position subdorsale; cette dernière paire peut être assez rarement, doublée à même hauteur d'une paire de pores latéro-subventraux; une paire de pores latéro-subdorsaux existe, toujours antérieure à l'anus et formant le prolongement de la ligne latéro-subdorsale.

Mâles: Caractéristiques biométriques données dans le Tableau II.

Corps très recourbé à la partie postérieure, présentant les mêmes caractéristiques que les femelles.

Deux testicules opposés, l'antérieur long de 232μ , le postérieur de 197μ ; partie germigène contenant des spermatocytes sur plusieurs rangs; spermatozoïdes ovales, mesurant en moyenne $6 \times 4 \mu$; spermiducte rectiligne, sans caractères particuliers, long de 1320μ . Spicules en faucille, à extrémité distale arrondie, élargis au milieu avec des contreforts longitudinaux; extrémité proximale moyennement effilée. Pièces accessoires à peine courbées, longuement coniques (Fig. 3, C, D).




Fig. 2. *Xiphinema vuittenezi* n. sp., types de queues des femelles des différentes populations. A —

Papilles adanales doubles, légèrement en relief, percées en leur centre d'un canal coudé dans l'épaisseur de la cuticule et dirigé vers l'avant. La même structure se retrouve chez les suppléments antérieurs (Fig. 3, C, D). Ces suppléments peuvent être au nombre de quatre à six. Sur certains individus, le supplément antérieur est moins développé, la papille n'est pas en relief et le canal très mince, presque imperceptible. A la partie postérieure du corps, la cuticule est très épaissie (9-11,5 μ) ventralement, au niveau de la file de suppléments. A ce niveau, une file de pores ventro-sublatéraux et une file de pores dorso-sublatéraux sont présentes chez tous les mâles examinés; ils font suite aux pores similaires s'étageant sur le corps des adultes, mais présentent à ce niveau, une répartition beaucoup plus régulière (Fig. 3, C).

Queue arrondie avec un léger mucron. Il existe trois paires de pores caudaux, une paire médiane au tiers postérieur, une paire médiane à la moitié, et, un peu antérieurement, une paire médio-subdorsale (Fig. 3, D). Il a été observé des mâles [pop. Aigues-Mortes et East-Malling] comportant quatre paires de pores caudaux.

Juvéniles: (pop. East Malling, Lisboa, Davis) — Les caractéristiques biométriques sont données dans le Tableau III.

Les juvéniles ont un aspect semblable à celui des adultes à l'exception de la

TABLEAU III Caractéristiques biométriques des juvéniles de *Xiphinema vuittenezi* n. sp.

| | L 1 | | L 2 | | L 3 | | Davis | L 4 | | Davis |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|
| | East Malling | Lisboa | East Malling | Lisboa | East Malling | Lisboa | | East Malling | Lisboa | |
| n | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| L | (0,88) | (0,94) | (1,2) | (1,17) | (1,70) | (1,72) | | (2,33) | (2,37) | (2,22) |
| a | 0,78-0,95 | 0,88-1,03 | 1,07-1,49 | 1,12-1,24 | 1,62-1,95 | 1,47-1,80 | 1,64 | 2,22-2,44 | 2,01-2,74 | 2,12-2,32 |
| b | (41,7) | — | (45,2) | — | (42,8) | — | — | (47,1) | — | — |
| c | 38,0-47,5 | — | 37,2-53,1 | — | 37,1-48 | — | — | 44,4-50,5 | — | — |
| Odontostyle | (3,45) | — | (3,65) | — | (4,29) | — | — | (5,07) | — | — |
| Partie basale du stylet | 3,1-4,0 | — | 3,0-5,1 | — | 3,5-4,9 | — | — | 4,6-5,7 | — | — |
| Styilet (longueur totale) | (19,2) | (19,1) | (25,6) * | (24,7) | (41,0) | (38,7) | — | (59,4) | (58,5) | (67,2) |
| Odontostyle de réserve | 16,6-21,5 | 18-20 | 23,2-28,0 | 23-26 | 34,8-45,6 | 34-43 | 36 | 52-66 | 49-63 | 63-73 |
| Distance de la base du guide à l'avant | (48,1) | (51,6) | (65,3) | (64,2) | (83,6) | (85,4) | — | (106,4) | (105,7) | (101,7) |
| Longueur de la queue (Lq) | 47-53 | 51-53 | 62-71 | 62-66 | 80-87 | 83-89 | 79 | 100-112 | 102-113 | 101,5-102 |
| Diamètre anal (da) | (37,1) | (36,3) | (47,2) | (45,0) | (57,2) | (56,4) | — | (67,5) | (65,1) | (60,5) |
| Lq/da | 34-40 | 36-38 | 43-50 | 42-46 | 53-62 | 54-59 | 51 | 63-74 | 61-68 | 59-64 |
| Mucron caudal | (85,8) | (87,9) | (112,2) | (109,1) | (140,2) | (141,8) | — | (174,1) | (170,8) | (162,2) |
| Diamètre au milieu du corps | 81-93 | 86-89 | 109-121 | 107-111 | 136-146 | 140-145 | 130 | 169-186 | 162-175 | 161-165 |
| | (66,4) | (64,1) | (84,2) | (81,9) | (107,1) | (105,7) | — | (128,9) | (128,3) | (122,3) |
| | 62-71 | 63-66 | 81-87 | 80-83 | 102-111 | 98-112 | 101 | 125-135 | 124-131 | 121-125 |
| | (45) | — | (58,2) * | — | (79,4) | — | — | (98,3) *) | — | — |
| | 43-50 | — | 56-59 | — | 74-84 | — | — | 93-105 | — | — |
| | (46) | (47,6) | (46) * | (47,6) | (41,4) | (44,8) | — | (39,4) | (40,4) | (33,1) |
| | 40-47 | 42-52 | 43-50 | 44-48 | 37-44 | 42-53 | 45 | 37-43 | 39-43 | 31-35 |
| | (15,6) | (14,4) | (19,3) | (18,2) | (27,5) | (25,6) | — | (34,1) | (31,4) | (29,7) |
| | 14-18 | 13-16 | 15,5-23 | 18-20 | 25-32 | 22-27 | 24 | 32-37 | 28-34 | 29-32 |
| | (2,97) | (3,42) | (2,34) * | (2,61) | (1,49) | (1,76) | — | (1,12) | (1,29) | (1,12) |
| | 2,8-3,3 | 3,2-3,6 | 2,0-2,9 | 2,5-2,7 | 1,2-1,7 | 1,6-2,0 | 1,88 | 1,0-1,3 | 1,2-1,5 | 1,07-1,16 |
| | (9) **) | — | (7) | — | (5,7) | — | — | (4,4) | — | — |
| | (9-11) | — | 6-9 | — | 5-6 | — | — | 3-6 | — | — |
| | (21,3) | — | (27,7) | — | (39,9) | — | — | (49,7) | — | — |
| | 19-25 | — | 22-34 | — | 34-45 | — | — | 43-56 | — | — |

*) 9 Juvéniles

***) 8 Juvéniles

donia oblonga) et pommier (*Malus sylvestris* ssp. *mitis*), East Malling, Kent, England. (Réc. J. J. M. Flegg);

— Voisinage des racines de vigne Tokay (*Vitis* sp.), Serres expérimentales, Davis, California, U.S.A.

Cette espèce a été également observée en Allemagne par l'un des auteurs (B.W.) dans la rhizosphère d'abricotiers (*Prunus armeniaca*) à Mainz et par Sturhan (1963) au voisinage des racines de groseillers (*Ribes nigrum*) et de pin sylvestre (*Pinus sylvestris*), dans une pépinière, à Hersbruck, près Nürnberg.

Diagnose: En dehors de *X. vuittenezi* n. sp., trois espèces didelphiques de *Xiphinema* possèdent une queue à profil général arrondi, ayant un rapport Lq/da voisin de 1 et portant un mucron n'atteignant pas le tiers de la longueur totale de la queue; il s'agit de *X. diversicaudatum* (Micoletzky, 1927) Thorne, 1939, *X. index* Thorne & Allen, 1950 et *X. mammillatum* Schuurmans Stekhoven & Teunissen, 1938 (cf. la redescription donnée par Luc & Tarjan, 1963).

Les principales caractéristiques biométriques relatives à ces trois espèces, ainsi que celles de *X. vuittenezi* n. sp. sont reportées dans le Tableau IV où les caractères différentiels sont imprimés en chiffres épais.

X. vuittenezi n. sp. se distingue très aisément de *X. index* et de *X. mammillatum* par la position postérieure de la vulve: 46-57% contre, respectivement, 38% et 38-42%. Cette espèce est différente en outre de *X. index* par un mucron caudal beaucoup plus court et situé moins ventralement ainsi que par le profil de la partie antérieure du corps, qui, chez *X. index*, est beaucoup plus effilé, la région labiale plus haute, étant moins nettement séparée du corps.

X. vuittenezi n. sp. se sépare de plus de *X. mammillatum* par un profil labial quelque peu différent, un corps plus élancé (coefficient „a” nettement plus faible chez *X. mammillatum*), un mucron caudal généralement moins développé et un diamètre anal plus faible entraînant un coefficient Lq/da plus élevé.

De *X. diversicaudatum*, *X. vuittenezi* n. sp. est séparé par la taille plus petite des femelles et des mâles, la vulve située postérieurement, la queue plus courte et le diamètre anal plus faible, le mucron caudal plus court et situé moins ventralement. De plus, l'épaississement maximal de la cuticule sur la queue (mesuré dorsalement, non au niveau du mucron) est plus important chez *X. vuittenezi*, ce qui apparaît nettement en le définissant par rapport au diamètre anal: l'épaisseur maximale de la cuticule sur la face dorsale de la queue exprimée en % du diamètre anal est en effet de 18-22% (20%) chez *X. diversicaudatum* et de 24,5-39,5% (31%) chez *X. vuittenezi* n. sp. Enfin, les mâles sont généralement rares (cf. infra) à l'intérieur des populations de *X. vuittenezi* n. sp. alors que chez *X. diversicaudatum*, ils représentent 40 à plus de 50% des adultes (Goodey, Peacock & Pitcher, 1960; Sturhan, 1963).

Remarque: Dans les différentes populations étudiées, les femelles montrent une remarquable uniformité quant aux différents caractères examinés. Seules, dans la population Narbonne-Plage malheureusement représentée par un faible nombre d'individus, les femelles diffèrent très légèrement par une queue nettement plus

TABLEAU IV

Caractéristiques biométriques de femelles de X. vuittenezi n. sp. comparées à celles des espèces les plus proches

trois femelles examinées contenaient des spermatozoïdes à l'intérieur de leur tractus génital. Les spermatozoïdes étaient localisés dans la poche à cellules sinueuses et dans la poche sphérique adjacente qui jouaient ainsi le rôle de spermathèque. Chez les femelles des autres populations où des mâles ont été rencontrés, aucun spermatozoïde ne fut observé.

D'autre part, dans toutes les populations, à l'exception de celle de Lauenstein, il a été observé des femelles dont la queue ne comportait pas de mucron (Fig. 1, E; Fig. 2, C). Toutefois, la fréquence de ce type est suffisamment faible pour qu'elle ne risque pas de faire confondre *X. vuittenezi* n. sp. avec les espèces appartenant au groupe des *Xiphinema* à queue hémisphérique.




Fig. 3. *Xiphinema vuittenezi* n. sp. A — ♀, partie antérieure (holotype), vue latérale. B — ♀, partie antérieure, pop. Narbonne-Plage, vue latérale. C-D — ♂, partie postérieure (allotype), vue latérale.

Les auteurs remercient très vivement M. A. Dalmaso qui leur a fait parvenir la population Narbonne-Plage, le Dr. R. S. Pitcher qui a prêté à l'un d'entre eux les deux lames contenant les individus prélevés à Davis (California), le Dr. D. Sturhan qui leur a permis d'utiliser les données d'un article alors impublié, M. A. Vuittenez qui a récolté et transmis la population Lauenstein, et enfin, plus particulièrement, le Dr. J. B. Goodey pour ses suggestions fructueuses et sa révision du manuscrit.

SUMMARY

Xiphinema vuittenezi n. sp. (Nematoda: Dorylaimidae)

Xiphinema vuittenezi n. sp. was discovered by the separate authors independently in France, Portugal, Germany and England and recognised as a new species. In the course of their work they discovered that they were all studying the same species. The following description includes the results of all authors. *X. vuittenezi* n. sp. is characterized by the rounded tail with short peg, the vulva in the middle of the body, the possession of two ovaries, the offset lip region and the appearance of the anterior end of the body (see Table 1). Males are rare. The nearest relatives are *X. diversicaudatum*, *X. index* and *X. mammillatum*.

X. vuittenezi n. sp. differs from *X. diversicaudatum* mainly in the smaller body size, the more posteriorly placed vulva, the shorter tail, the narrower anal-body-width, the shorter and more ventrally placed tail peg as well as the rarity of males. From *X. index* the new species differs primarily in the position of the vulva, the considerably shorter tail peg and the shape of the anterior end and lip region. *X. mammillatum* is shorter and fatter than *X. vuittenezi*, has a more anterior vulva and only slightly offset lip region (see Table 4). So far *X. vuittenezi* has been found on grape vines, sugar cane, quince, apricot, black currant, scotch pine and apple.

ZUSAMMENFASSUNG

Xiphinema vuittenezi n. sp. (Nematoda: Dorylaimidae)

Xiphinema vuittenezi n. sp. wurde von den einzelnen Autoren unabhängig voneinander in Frankreich, Portugal, Deutschland und England entdeckt und als neue Art erkannt. Erst im Laufe der Untersuchungen erfuhren sie, dass alle die gleiche Art bearbeiteten. Die vorliegende Beschreibung umfasst die Ergebnisse aller Autoren. *X. vuittenezi* n. sp. ist gekennzeichnet durch einen abgerundeten Schwanz mit kurzer Spitze, durch die Lage der Vulva in Körpermitte, den Besitz von zwei Ovarien, die abgesetzte Lippenregion und das Profil des gesamten Vorderendes. (vgl. Tab. 1). Männchen sind selten. Nahe verwandte Arten sind *X. diversicaudatum*, *X. index* und *X. mammillatum*. *X. vuittenezi* n. sp. unterscheidet sich von *X. diversicaudatum* in erster Linie durch geringere Körpergröße, die weiter nach hinten liegende Vulva, den kürzeren Schwanz, die geringere Analfbreite, die kürzere und weniger ventral liegende Schwanzspitze sowie durch die Seltenheit der Männchen. Von *X. index* ist die neue Art vor allem durch die Lage der Vulva, die wesentlich kürzere Schwanzspitze und durch das Profil des Vorderendes und der Lippenregion unterschieden. *X. mammillatum* ist kürzer und dicker als *X. vuittenezi* n. sp., besitzt eine weiter vorn liegende Vulva und eine nur schwach abgesetzte Lippenregion. (vgl. Tab. 4). Bisher wurde *X. vuittenezi* n. sp. an Reben, Zuckerrohr, Quitte, Aprikose, Schwarzer Johannisbeere und Kiefer gefunden.

BIBLIOGRAPHIE

- GOODEY, J. B. & HOOPER, D. J. (1963). The nerve rings of *Longidorus* and *Xiphinema*. *Nematologica* **9**, 303-304.
- GOODEY, J. B., PEACOCK, F. C. & PITCHER, R. S. (1960). A redescription of *Xiphinema diversicaudatum* (Micoletzky, 1923 & 1927) Thorne, 1939 and observations on its larval stages. *Nematologica* **5**, 127-135.
- LIMA, M. B. (1962). *Introdução ao estudo dos nemátodos de Portugal Continental*. Lisboa; Inst. Sup. Agron.; 141 pp. ronéo.
- LUC, M. (1961). Structure de la gonade femelle chez quelques espèces du genre *Xiphinema* Cobb, 1913 (Nematoda-Dorylaimidae). *Nematologica* **6**, 144-154.
- LUC, M. & TARJAN, A. C. (1963). Redescription de *Xiphinema rotundatum* Schuurmans Stekhoven & Teunissen, 1938 et de *X. mammillatum* Schuurmans Stekhoven & Teunissen, 1938 (Nematoda: Dorylaimidae). *Nematologica* **9**, 116-124.
- STURHAN, D. (1963). Beitrag zur Systematik der Gattung *Xiphinema* Cobb, 1913. *Nematologica* **9**, 205-214.
- THORNE, G. & ALLEN, M. W. (1950). *Paratylenchus hamatus* n. sp. and *Xiphinema index* n. sp., two nematodes associated with fig roots, with a note on *Paratylenchus anceps* Cobb. *Proc. helm. Soc. Wash.* **17**, 27-35.
- VUITTENEZ, A. (1962). Nématodes vecteurs de virus et le problème de la dégénérescence infectieuse de la vigne. in: *Les Nématodes*; Paris; Féd. nat. Group. Protect. Cult.; p. 55-77.
- WEISCHER, B. (1960). Untersuchungen über das Auftreten pflanzenparasitärer Nematoden in Weinbergböden. *Nematologica* Suppl. No. **2**, 29-39.
- WU, LIANG-YU (1958). Morphology of *Diitylenchus destructor* Thorne, 1945 (Nematoda: Tylenchidae), from a pure culture, with special reference to reproductive system and esophageal glands. *Canad. J. Zool.* **36**, 569-576.

Accepté: le 30 Décembre 1963.