

Centre O.R.S.T.O.M. de DAKAR
(Démographie)

B.P. 1386

DAKAR

(Sénégal)

RESULTATS D'UNE ENQUETE SUR LES RAPPORTS SEXUELS

à PIKINE
et KHOMBOLE - THIENABA

par Mmes S. CHARREAU

et VIGNAC-BUTTIN

avec la collaboration de

MM. P. CANTRELLE

B. LACOMBE

et J. VAUGELADE.

O.R.S.T.O.M. Fonds Documentaire

N° : 22440, ex 1

Cpte : B

O. R. S. T. O. M.

Collection de Référence

n°

S O M M A I R E

- P. 2 Avant - propos
- P. 3 Présentation des enquêtes de Pikine et Khombole - Thienaba
par Mme B. VIGNAC - BUTTIN
- P. 6 Enquête sur les rapports sexuels chez un échantillon de
femmes à Pikine.
par Mme B. VIGNAC - BUTTIN
- P. 7 Pyramide des âges
- P. 8 Relations entre l'âge et les rapports
- P.10 Règles mensuelles et rapports
- P.11 Nombre de jours disponibles pour des rapports
- P.12 Causes de non - rapports
- P.14 Conclusion
- P.15 Enquête sur les rapports sexuels à Khombole - Thienaba
par Mmes S. CHARREAU
et B. VIGNAC - BUTTIN
- P.15 Pyramide des âges
- P.18 Relations entre l'âge et les rapports
- P.22 Règles mensuelles et rapports
- P.24 Nombre de jours disponibles pour des rapports
- P.25 Causes de non - rapports
- P.26 Conclusion.-

Note - générale aux tableaux

NA = nombres absolus

NP = nombres proportionnels

- AVANT PROPOS -

Le texte que l'on va lire reste sommaire car il se contente d'exposer les résultats d'une enquête dont le champs d'investigation était restreint.

Le principal intérêt de cette enquête était de savoir s'il était possible d'engager une recherche dans cette voie, ce qui explique qu'elle se soit contentée d'être un instantané.

On peut remarquer que certaines variables importantes sont omises, comme la polygamie.

Le présent rapport ne peut donc apporter que des éléments pour une telle étude.

Le Docteur P. CANTRELLE est à l'origine de cette enquête, le dépouillement et la rédaction ont été assurés par

Mmes S. CHARREAU et
VIGNAC-BUTTIN

en collaboration avec

MM. B. LACOMBE et
J. VAUGELADE

PRESENTATION DES ENQUETES DE PIKINE ET KHOMBOLE - THIENABA

Cette enquête sur les rapports sexuels a été faite à partir d'un questionnaire posé à des femmes mariées, au cours d'une enquête sur la fécondité.

Ce questionnaire était centré sur la fréquence des rapports sexuels durant la semaine précédent l'enquête, sur la régularité des règles mensuelles, ou au contraire, sur les causes d'aménorrhée. S'il n'y avait eu aucun rapport, on en demandait la cause. Enfin, on demandait aussi si le mari était présent durant toute la semaine ou seulement pendant quelques jours afin de déterminer la durée de présence du couple.

Pour chaque question, les différents items retenus ont été codifiés afin de pouvoir reporter les réponses de chaque femme sur des cartes à perforations marginales, et d'effectuer un dépouillement manuel rapide. Il y a une fiche par femme. Chaque fiche porte le numéro attribué à la femme pour l'enquête fécondité, et le numéro de la concession où elle vit.

Les items sont les suivants :

- circonstances biologiques
 - . règles
 - . absence de règles (grossesse - allaitement - avortement - trop âgée - trop jeune - maladie).
- rapports : Oui - Non
- fréquence des rapports
- cause des non-rapports
 - . vient d'accoucher ou va accoucher
 - . en période de règles
 - . maladie de la femme - du mari
 - . cela dépend de la femme
 - . cela dépend du mari (mari a autre résidence)
 - . femme ou mari en voyage
 - . femme ou mari trop âgé
 - . en désaccord
 - . autre -(présence d'un étranger de la famille - la famille est en deuil).
- Nombre de jours disponibles pendant la semaine.
- Durée de présence ensemble
- Nombre de jours de règles
- Groupe d'âge de la femme
- Groupe d'âge du mari.

Pour la rubrique, cause de non-rapports, il faut souligner l'ambiguïté de la réponse donnée par les femmes "cela dépend du mari", cause qui recouvre aussi bien l'absence du mari que des raisons personnelles, ce qui explique qu'en zone urbaine, la séparation temporaire (c'est-à-dire : cela dépend du mari "mari a autre résidence" ou "mari en voyage" des époux ait tant d'importance.

La rubrique "nombre de jours de règles" n'a pas été analysée, les réponses des femmes étant beaucoup trop incertaines :

A PIKINE, les enquêtrices ont seulement demandé le dernier jour des règles.

A KHOMBOLE et en zone rurale, elles ont demandé le dernier jour, et, pour celles en période de règles, depuis combien de jours elles ont leurs règles, mais on ne sait pas, parmi ces dernières, qu'elle est la proportion des femmes dont les règles sont juste terminées et celles qui sont en cours. On ne peut donc rien dire sur la durée des règles.

Enfin, les âges sont mal connus, l'âge fourni par les femmes est très relatif, vu l'absence d'état civil. Parfois, il manque même. L'omission de l'âge chez les hommes est plus forte ; ceux-ci n'ayant pas été interviewés, et les âges que l'on possède sur eux sont encore plus sujet à caution.

Mme B. VIGNAC-BUTTIN

ENQUETE SUR LES RAPPORTS SEXUELS CHEZ UN
ECHANTILLON DE FEMMES A PIKINE

Par Mme B. VIGNAC-BUTTIN

Janvier 1970

L'enquête a été effectuée au cours du premier trimestre 1969. Elle portait sur un échantillon de 682 femmes observées pour leur fécondité, dans la banlieue dakaroise de PIKINE.

Sur ces 682 femmes, 418 réponses ont été obtenues. Sur les 264 autres, 3 seulement ont refusé de répondre. Les 261 autres étaient absentes, ou sont des femmes vivant seules (célibataires, veuves ou divorcées) à qui aucune question n'a été posée. Elles se répartissent ainsi :

Femmes absentes	70
Célibataires	159
Veuves, divorcées	32
Refus de répondre	3
	<hr/>
	264

Les questions portaient sur l'existence de rapports sexuels pendant la semaine précédent l'enquête : leur nombre, ou les causes d'absence de rapports.

Seules les femmes ont été interrogées.

1.- Pyramide des âges

Tableau : Groupes d'âges des époux des couples observées

Groupe d'âge de la femme	Groupe d'âges du mari							Ensemble
	30ans	30-34	35-39	40-44	45-49	50 +	ND	
20 ans	4	5	3	3	4	-	16	35
20-24	5	18	25	10	5	6	10	79
25-29	3	10	24	23	10	11	7	88
30-34	-	8	15	28	11	14	4	80
35-39			9	22	23	10	13	77
40-44				5	8	10	5	28
45-49					6	11	1	18
50 +						1	2	3
Ensemble	12	41	76	91	67	63	58	408

Elle a été établie en prenant seulement les couples dont on connaissait l'âge exact de la femme (408) femmes.

Ainsi, toutes les analyses ne porteront que sur ces 408 femmes.

On remarque que l'âge moyen des hommes est plus élevé que celui de leurs épouses.

2.- Relation entre l'âge et les rapports sexuels

Tableau : Nombre de personnes ayant eu des rapports
la semaine précédente

AGES	FEMMES			HOMMES		
	OUI	Ensemble	% OUI	OUI	Ensemble	% OUI
15 - 19	18	35	51			
20 - 24	43	79	54			
25 - 29	49	88	61	9	12	75
30 - 34	38	80	48	22	41	54
35 - 39	34	77	44	38	76	50
40 - 44	13	28	46	41	91	45
45 - 49	5	18	28	28	67	42
50 +	2	3		34	63	54
N.D.	-	-		30	58	52
Ensemble	202	408	50	202	408	50

On remarque que, pour les deux sexes, ce sont surtout les individus de moins de 30 ans qui ont des rapports sexuels. Il y a ensuite de moins en moins d'individus ayant une activité sexuelle. La proportion des rapports "oui" remonte cependant, de façon assez inexplicable, pour les hommes de plus de 50 ans.

Ce tableau ne mesure pas la fréquence hebdomadaire des rapports qui n'est saisie que le tableau suivant.

Nombre de rapports	1	2	3	4	5 +	Ens.	N.D.	Ens.
Nbre de réponses N.A.	116	55	16	4	1	192	10	202
N.P.	61	28	8	2	1	100		
Nbre total de rapports N.A.	116	110	48	16	5	295	-	-
N.P.	39	38	16	5	2	100		

Sur ces 192 femmes dont on connaît la fréquence des rapports, 161 ont eu les 7 jours disponibles ainsi qu'il sera vu plus loin. Etant donné que 89% des femmes n'ont eu qu'1 ou 2 rapports le nombre de jours disponibles n'altère pas la moyenne hebdomadaire des rapports.

Fréquence des rapports par semaine

Chez les femmes				Chez les hommes			
Classes d'âges	Nombre de rapports	Nombre de femmes	Nombre moyen de rapports	Classes d'âges	Nombre de rapports	Nombre d'hommes	Nombre moyen de rapports
15-19	38	18	2,1	- de 30	13	9	1,4
20-24	70	42	1,7	30-34	31	20	1,5
25-29	68	45	1,7	35-39	57	38	1,5
30-34	48	38	1,3	40-45	57	39	1,5
35-39	45	31	1,5	45-49	41	25	1,6
40 & +	26	18	1,4	50 & +	50	32	1,6
-	-	-	-	Non déterminées	46	29	1,6
Ensemble	295	192	1,5	Ensemble	295	192	1,5

Pour les femmes, la plus grande fréquence est en-dessous de 30 ans (près de 2 rapports sexuels hebdomadaires).

Pour les hommes, cette fréquence semble indépendante de l'âge (autour d'1,5 rapport hebdomaire).

3.- Règles mensuelles et rapports

Le tableau qui croise l'existence de rapports sexuels avec, pour la femme, la présence ou non de règles régulières, montre que le fait de ne pas être réglée réduit légèrement l'activité sexuelle.

		Femmes réglées		
		OUI	NON	OUI
Rap- ports	OUI	96	106	202
	NON	85	121	206
	Ens.	181	227	408

Le tableau suivant permet d'examiner les causes d'absence des règles mensuelles.

Femmes non réglées - Causes (note page suivante)

Groupes d'âges	Femmes réglées	Femmes non réglées			Ensemble	% des femmes non réglées pour cause d'enfants (2)
		Grossesses	Allaitement	Autres (1)		
15 - 19	17	6	9	3	35	46
20 - 24	30	7	40	2	79	60
25 - 29	32	9	44	3	88	60
30 - 34	33	7	36	4	80	55
35 - 39	38	9	23	7	77	42
40 - 44	18	5	3	2	28	29
45 - 49	12	-	1	5	18	-
50 & +	1	-	-	2	3	-
Ensemble	181	43	156	28	408	49

Notes du tableau : Femmes non réglées - Causes de la page précédente :

(1) Autres : 20 pour cause de maladie - 1 trop jeune, 5 trop âgées - 2 avortements (15-19 et 30-34 ans).

(2) avortements compris.

Les 227 femmes non réglées se répartissent ainsi proportionnellement :

Grossesse	19
Allaitement	69
Autres	12
	<hr/>
	100

4.- Nombre de jours possibles pour les rapports sexuels

Quand on examine le nombre de jours possibles, pour les rapports sexuels, on remarque deux groupes intéressants :

- celui pour lequel aucun jour n'est possible (51 femmes)
- celui pour lequel les 7 jours de la semaine précédant l'enquête ont été possibles (258 femmes).

Dans le premier groupe, il n'y a eu aucun rapport sexuel pour deux raisons : accouchements, ou séparation temporaire des époux.

En effet, la moitié de ces femmes viennent d'accoucher ou vont accoucher incessamment ; l'autre moitié sont des femmes séparées de leur mari en voyages.

Dans le deuxième groupe, l'analyse doit porter sur les 97 femmes qui n'ont eu aucun rapport sexuel dans la semaine précédant l'enquête (soit 38% des femmes ayant 7 jours disponibles). Parmi elle, la moitié allaite, et 50% d'entre elles (donc le quart du total) déclarent que soit leur mari (15 cas) soit elles-mêmes (10 cas) ont estimé qu'il était préférable de s'abstenir. On peut comparer cette proportion (50%) à celle

trouvée chez les femmes qui n'allaitent pas (soit 47 femmes sur ces 97) = elle est de 30% seulement (14 cas = 7 cas où le refus vient du mari, 7 cas où le refus vient de la femme).

5.- Causes de non-rapport

L'ensemble des causes expliquant pourquoi il n'y a pas eu de rapports est fourni au tableau ci-dessous.

Causes de non-rapport

Causes	Ac- cou- chem.	En péri- de règles	Maladie de la fem- me	l'- hom- me	Age trop élevé	Cela dépend de la fem- me		de l' hom- me	Vo- yages	Brouil- le	Au- tres	Ens.
Réponses												
N.A.	37	9	27	14	3	28	34	38	6	10	206	
N.P.	18	4	13	7	2	14	16	18	3	5	100	

On remarque l'importance du voyage, et de l'accouchement (18% chaque), de la maladie (20%) principalement féminine, et de la relation conjugale (refus du mari ou de la femme 30%).

Regroupée - comme dans le tableau ci-après, ces causes peuvent être détaillées par groupes d'âges, mais les effectifs en cause, trop faibles numériquement, ne permettent aucune conclusion.

Classes d'âges	Causes physiques (1)	Causes subject. (2)	Séparation temporaire (3)	Autres (4)	Ensemble
15 - 19	6	5	4	2	17
20 - 24	16	12	8	-	36
25 - 29	18	12	4	5	39
30 - 34	20	15	5	2	42
35 - 39	22	4	13	4	43
40 & +	8	14	4	3	29
Ensemble	<u>90</u>	<u>62</u>	<u>38</u>	<u>16</u>	<u>206</u>

(1) accouchement, règles, maladies, âge trop élevé.

(2) cela dépend de moi ou de mon mari.

(3) voyage de l'un ou l'autre des conjoints

(4) dont brouilles.

EN CONCLUSION, on peut remarque que la simplicité des questions posées impose une limite à l'analyse.

On décèle bien une liaison entre l'âge et la fréquence des rapports sexuels ainsi qu'entre les conditions physiques de la femme et les rapports sexuels, mais rien de très pertinent ne peut être conclu, le nombre de facteurs en jeu dépassant nettement les thèmes que s'était donnée cette enquête.

ENQUETE SUR LES RAPPORTS SEXUELS à KHOMBOLE - THIENABA

Mme S. CHARREAU

Mme B. VIGNAC-BUTTIN

Février 1970

L'enquête a été effectuée en cours du dernier trimestre de l'année 1969. Elle portait sur un échantillon de 396 femmes pour KHOMBOLE (zone urbaine) et de 480 femmes pour 6 villages de la zone rurale. Cet échantillon fait partie de l'ensemble des femmes observées lors de l'enquête sur la fécondité. Elle ne s'adressait pas aux célibataires, veuves ou divorcées, mais à toutes les autres femmes présentes. Il n'y eut aucun refus de réponse.

Les deux zones (urbaine et rurale) ont été étudiées séparément pour l'analyse de chaque question, l'intérêt de l'enquête étant la comparaison des comportements des couples dans les deux zones.

I.- Pyramide des âges (Voir tableaux p. 6 et 7)

Au contraire de PIKINE, les femmes d'âge indéterminé ont été conservées vu leur nombre.

Ce nombre de femmes d'âge non-déterminé est plus élevé en milieu rural (118 femmes sur 480, soit 25%) qu'en milieu urbain (20 sur 396, soit moins de 6%).

PYRAMIDE DES AGES

KHOMBOLE

GROUPE D'AGES DE LA FEMME	GROUPE D'AGES DU MARI							N.D.	Ensemble
	- 30 ans	30-34	36-39	40-44	45-49	50 +			
- 20	10	2	3	2	I		19	37	
20 - 24	8	4	II	2	3	I	33	62	
25 - 29	6	6	14	4	10	6	55	101	
30 - 34			4	5	II	7	42	69	
35 - 39	2		2	2	12	19	41	78	
40 - 44					2	9	9	20	
45 - 49					2	I	5	8	
50 +							I	I	
Non déterminé	2						18	20	
ENSEMBLE	28	12	34	15	41	43	223	396	

ZONE RURALE

PYRAMIDE DES AGES

GROUPE D'AGES DE LA FEMME	GROUPE D'AGES DU MARI							Ensemble
	- 30 ans	30-34	35-39	40-44	45-49	50 +	N.D.	
- 20	6	I			I	I	I3	22
20 - 24	3	7	7	3	I		20	4I
25 - 29	3	I5	I2	9	5	6	40	90
30 - 34	I	-	8	I3	9	I7	39	87
35 - 39	I	I	I	I4	I3	20	23	73
40 - 44			I	I	9	6	I2	29
45 - 49	2			2	6	I	5	I6
50 +						2	2	4
Non déterminé	I	2	8	6	7	5	89	II8
ENSEMBLE	I7	26	37	48	5I	58	243	480

Pour les hommes, ce nombre est très élevé : les femmes, seules interrogées, ne sachant pas l'âge de leur mari, et la question ne leur ayant été posée qu'à un seul passage de l'enquête fécondité. Pour KHOMBOLE, il s'agit de 223 hommes sur 396 (soit 56% des hommes) et pour la zone rurale, il s'agit de 243 hommes sur 480 (soit 51%).

Aucune différence significative n'apparaît dans la répartition des classes d'âges entre les deux zones. Les différences obtenues entre la zone urbaine et la zone rurale dans les réponses aux questions posées n'est donc pas fonction de la structure par âge de chaque zone.

2.- Relation entre l'âge et les rapports sexuels

Voir le tableau de la page 9

Il est à remarquer la forte proportion des individus, hommes et femmes, qui ont des rapports sexuels. Cette proportion est plus élevée en zone rurale : 72% de oui pour l'ensemble des couples qu'à KHOMBOLE (57%).

Pour les femmes de la zone rurale, le pourcentage de oui, a des variations qui peuvent s'expliquer par le fort pourcentage de femmes (25%) dont l'âge n'est pas connu.

Pour les hommes, à KHOMBOLE, la proportion maximum d'individus ayant des rapports sexuels est dans la classe : 45 - 49 ans, alors que c'est dans la classe 30 - 34 ans en zone rurale.

La fréquence des rapports est saisie par la fréquence hebdomadaire des rapports par semaine (47% d'entre elles en ont 1, 49% en ont 2) ; en zone rurale, elles ont toutes 2 rapports (81% des femmes ont 2 rapports).

Voir le tableau page 10.

Cette fréquence hebdomadaire a été mise en relation avec le nombre de jours disponibles dans la semaine, comme il sera vu plus loin.

A KHOMBOLE, sur les 227 femmes qui ont eu des rapports, 183 avaient 7 jours disponibles.

Dans la zone rurale, 338 femmes sur 345 ayant eu des rapports, ont eu 7 jours disponibles.

Ages	Rapports Oui:	Ensemble des hommes	% des Oui	Ages	Rapports Oui	Ensemble des femmes	% des Oui
<u>/ KHOMBOLE /</u>							
				15 - 19	18	37	49
				20 - 24	26	62	42
- de 30 ans	15	28	53	25 - 29	58	101	57
30 - 34	6	12	50	30 - 34	46	69	67
35 - 39	18	34	53	35 - 39	49	78	63
40 - 44	10	15	67	40 - 44	11	20	55
45 - 49	31	41	75	45 - 49	5	8	-
50 et +	28	43	65	50 et +	1	1	-
N.D.	119	223	53	N.D.	13	20	65
ENSEMBLE	227	396	57	ENSEMBLE	227	396	57
<u>/ ZONE RURALE /</u>							
				15 - 19	13	22	59
				20 - 24	31	41	75
- de 30 ans	9	17	53	25 - 29	72	90	80
30 - 34	21	26	81	30 - 34	58	87	67
35 - 39	27	37	73	35 - 39	59	73	79
40 - 44	34	48	71	40 - 44	20	29	69
45 - 49	35	51	69	45 - 49	13	16	81
50 et +	41	58	71	50 et +	3	4	-
N.D.	176	243	72	N.D.	76	118	64
ENSEMBLE	345	480	72	ENSEMBLE	345	480	72

	KHOMBOLE				ZONE RURALE			
	Nombre de réponses		Nombre de rapports		Nombre de réponses		Nombre de rapports	
	N.A.	N.P.	N.A.	N.P.	N.A.	N.P.	N.A.	N.P.
I	147	65	147	47	97	28	97	16
2	76	34	152	49	243	70	486	81
3	3	1	9	3	5	2	15	3
4	1	-	4	1				
ENSEMBLE	227	100	312	100	345	100	598	100

Les femmes ayant eu des rapports sont donc pour 92% d'entre elles des femmes qui ont eu les 7 jours de la semaine disponibles.

On peut donc estimer que les variations de jours disponibles, pour les 8% de femmes restant, n'influent pratiquement pas la moyenne hebdomadaire des rapports.

Le nombre moyen de rapports, plus élevé en milieu rural (1,7) qu'à KHOMBOLE (1,4) a été analysé pour chaque classe d'âges.

KHOMBOLE

Classes d'âges	FEMMES			Classes d'âges	HOMMES		
	Nbre de rapports	Nbre de femmes	Nbre moy. de rap.		Nbre de rapports	Nbre d'hommes	Nbre moy. de rap.
15 - 19	26	18	1,4				
20 - 24	38	26	1,5	- de 30	23	15	1,5
25 - 29	89	58	1,5	30 - 34	12	6	2
30 - 34	58	46	1,3	35 - 39	28	19	1,5
35 - 39	64	49	1,3	40 - 44	15	10	1,5
40 - 44	13	11	1,2	45 - 49	39	31	1,3
45 et +	6	6	-	50 et +	33	28	1,2
N.D.	18	13	1,4	N.D.	162	119	1,4
ENSEMBLE	312	227	1,4	ENSEMBLE	312	227	1,4

FEMMES ZONE RURALE HOMMES

15 - 19	25	13	1,9				
20 - 24	56	31	1,8	- de 30	16	9	1,8
25 - 29	121	72	1,7	30 - 34	35	21	1,7
30 - 34	100	58	1,7	35 - 39	48	27	1,8
35 - 39	103	59	1,7	40 - 44	58	34	1,7
40 - 44	32	20	1,6	45 - 49	50	35	1,4
45 et +	25	16	1,5	50 et +	77	41	1,9
N.D.	136	76	1,8	N.D.	313	177	1,8
ENSEMBLE	598	345	1,7	ENSEMBLE	598	345	1,7

A KHOMBOLE, pour les femmes l'amplitude des différences de fréquence entre classes d'âges est très faible. La fréquence diminuant toutefois avec l'âge.

Pour les hommes, la fréquence semble diminuer faiblement avec l'âge.

En ZONE RURALE, la décroissance de la fréquence est très régulière pour les femmes, alors que la proportion des femmes ayant des rapports était très variable d'une classe d'âges à l'autre.

Pour les hommes, la fréquence est pratiquement la même pour toutes les classes d'âges, sauf pour les 45 - 49 ans qui ont la fréquence la plus faible (1,4).

3.- Règles mensuelles et rapports

Les présents tableaux croisent l'existence des rapports sexuels avec, pour la femme, la présence ou non de règles régulières.

		KHOMBOLE			ZONE RURALE			
		Femmes réglées			Femmes réglées			
		OUI	NON	ENS.	OUI	NON	ENS.	
Rapports	OUI	68	159	227	OUI	100	245	345
	NON	75	94	169	NON	40	95	135
	ENS.	143	253	396	ENS.	140	340	480

A KHOMBOLE, 48% des femmes réglées ont des rapports et 63% des non-réglées. En ZONE RURALE, le pourcentage de femmes qui ont des rapports est de 71% des réglées et 72% des non-réglées.

Contrairement à ce qui a été signalé pour PIKINE, à KHOMBOLE; le fait d'être réglée régulièrement réduit légèrement l'activité sexuelle et en zone rurale, ce fait n'altère en rien l'activité sexuelle.

Les tableaux suivants permettent de connaître les causes d'absence des règles mensuelles.

Groupes d'âges	Femmes régliées	Femmes non réglées			Ensemble	% de femmes non régliées pour cause d'en- fants
		Gros- sesse	Allai- tement	Autrés		
/ KHOMBOLE /						
15 - 19	11	6	20	-	37	70
20 - 24	23	4	35		62	63
25 - 29	30	15	56		101	70
30 - 34	26	4	39		69	62
35 - 39	27	7	44		78	65
40 - 44	12	3	5		20	40
45 - 49	6	-	2		8	25
50 et +	-	-	1		1	-
N.D.	8	2	10		20	60
ENSEMBLE	143	41	212		396	64
/ ZONE RURALE /						
				(I)		
15 - 19	8	7	7	-	22	64
20 - 24	6	6	29	-	41	85
25 - 29	19	7	63	1	90	78
30 - 34	22	15	50	-	87	75
35 - 39	24	7	41	1	73	66
40 - 44	13	3	13	-	29	55
45 - 49	11	2	3	-	16	31
50 et +	2	-	2	-	4	-
N.D.	35	16	64	3	118	70
ENSEMBLE	140	63	272	5	480	71

(I) C'est-à-dire : maladies - ou trop âgées.

Il faut remarquer le fort pourcentage de femmes non réglées, parce qu'en-
ceintes ou venant d'accoucher : 64% des femmes à KHOMBOLE, 71% des femmes
en zone rurale.

Elles ont de 20 à 39 ans.

La proportion n'est que de 49% à PIKINE.

4.- Nombre de jours possibles pour les rapports sexuels

Quand on examine l'ensemble des jours disponibles pendant la semaine, on remarque que les 2 groupes importants - celui pour lequel aucun jour n'est possible, et celui pour lequel les 7 jours sont possibles - sont très différents d'une zone à l'autre.

A KHOMBOLE, 32% des femmes (127 femmes sur 396) n'ont eu aucun jour disponible, et 54% ont eu les 7 jours disponibles (216 femmes sur 396).

Par contre, en zone rurale, 16% seulement des femmes (78 sur 480) n'ont eu aucun jour disponible, et 76% ont eu les 7 jours disponibles (367 sur 480).

A PIKINE, cette répartition est de 12% pour le 1er groupe (51 femmes sur 408 n'ont eu aucun jour disponible) et de 63% pour le 2ème (258 femmes sur 408 ont eu les 7 jours de disponible).

Les causes de non-rapport expliquent cette différence entre la zone urbaine et la zone rurale.

A KHOMBOLE, les hommes ne résident pas toujours dans la concession de leur femme, aussi la séparation temporaire des époux (mari dans autre résidence, ou mari en voyage) est une des causes principales (67% des cas) du fait de n'avoir aucun jour disponible alors qu'à PIKINE, la séparation temporaire des époux était le cas de 51% de ces couples.

Par contre, en zone rurale, les femmes n'ayant eu aucun jour disponible pour les rapports sexuels, pendant la semaine précédant l'enquête, sont pour 83% des femmes allant accoucher, ou venant d'accoucher. Ceci s'explique par le fort pourcentage des femmes enceintes, caractéristique déjà mentionnée, et par le faible déplacement des hommes - (l'enquête a eu lieu pendant la récolte des arachides, époque qui exigeait la présence des hommes dans leurs villages).

Quant aux groupes de femmes ayant eu les 7 jours de disponible, le pourcentage de celles qui n'ont eu aucun rapport est très faible (15% pour KHOMBOLE et 8% pour la zone rurale). Ces femmes ont leurs règles, ou allaitent principalement, en zone rurale. La moitié d'entre elles dans les 2 zones disent ne pas avoir eu de rapport parce qu'elles sont "malades".

5.- Causes de non-rapport

Ces causes sont mentionnées dans les tableaux suivants :

Causes	Accouchement	En période de règles	Maladie de		Cela dépend de la femme	Séparation temporaire		Autres	Ensemble
			la femme	de l'homme		mari autre	Voyages		
						résidence			
/ KHOMBOLE /									
Réponses									
N.A.	21	16	7	4	6	79	9	27	169
N.P.	12	10	4	2	4	47	5	16	100
/ ZONE RURALE /									
Réponses									
N.A.	69	29	12	-	1	4	3	17	135
N.P.	51	21	9	-	1	3	2	13	100

Comme nous l'avons déjà vu, à KHOMBOLE, la cause principale est la séparation des époux ; en zone rurale, c'est l'accouchement.

Mais les femmes en période de règles sont relativement plus importante qu'à PIKINE. C'est le cas de 10% d'entre elles à KHOMBOLE, de 21% en zone rurale et seulement de 4% à PIKINE. Y-a-t-il simple hasard ou les femmes de PIKINE n'ont-elles pas toutes osé dire qu'elles avaient leurs règles mais par contre, se seraient dites "malades", puisqu'à PIKINE 13% des femmes se disent "malades", contre 4%, seulement à KHOMBOLE, et 9% en zone rurale ?

Le nombre de femmes d'âge indéterminé étant très élevé, la répartition des causes de non-rapport par classe d'âges n'apporte aucun élément nouveau.

* * *

**

CONCLUSION

Malgré la simplicité des questions posées, des différences significatives apparaissent entre les zones urbaine et rurale, trait le plus intéressant de cette présente enquête.

Le comportement des couples est tout autre selon la zone où ils vivent. C'est en zone rurale que la proportion des couples ayant des rapports sexuels est la plus grande, et que la fréquence de ces rapports est la plus forte. La probabilité de conception est donc bien plus importante en milieu rural - le pourcentage des femmes enceintes y est, en effet, plus élevé - ce qui souligne l'importance des facteurs psycho-sociologiques pour le problème de la fécondité.
