

PRÉSENCE DE *GLOSSINA NASHI* POTTS 1955  
EN AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Par L. MAILLOT et R. TAUFFLIEB (\*)

En juin 1953, parmi un lot de glossines en provenance du district de Nola (Région de la Haute Sangha, Oubangui-Chari) capturées au début du mois de mai, l'un de nous a pu mettre en évidence deux exemplaires, un mâle et une femelle, d'une glossine n'appartenant à aucune des espèces connues à ce jour. Le mauvais état des spécimens n'avait permis que de faire l'étude des genitalia et des antennes et la description de l'espèce avait été différée en attendant la capture d'autres exemplaires.

Le 26 juillet 1955 dans le massif forestier du Mayombe, le long de la rivière Loukénéne (district de M'Vouti, Région du Kouilou, Moyen-Congo), nous avons pu capturer un certain nombre de glossines du groupe *fusca*, les espèces déterminées étant *Glossina hanningtoni* Newstead et Evans, *Glossina tabaniformis* Westwood et une femelle comparable, par les genitalia, à l'espèce rencontrée en Oubangui-Chari. Ces 3 exemplaires (2 femelles et 1 mâle) sont tout à fait conformes à la récente description de *Glossina nashi* donnée par Potts (1), les caractères distinctifs étant, en dehors des genitalia très caractéristiques :

- la teinte foncée des 5 segments du tarse III, bien que les deux derniers segments soient plus foncés que les trois précédents,
- la présence d'une bande sombre au bord distal de l'avant-dernier segment du tarse moyen, ce caractère, comme le fait remarquer Potts, étant moins net chez la femelle que chez le mâle,
- la teinte des pleures tirant vers le jaune-orange,
- le rapport de la longueur de trompe à la largeur de la tête un peu inférieur à 1,5.

(\*) Séance du 8 décembre 1955.

O. R. S. T. O. M. Fonds Documentaire

N° 28949 ex 1

Cote B

En résumé, *Glossina nashi* Potts 1955, décrite du Cameroun britannique, a été rencontrée en A. E. F. en deux régions très éloignées, dans le district de Nola (Oubangui-Chari) et dans celui de M'Vouti (Moyen-Congo). Ces deux districts sont des régions de grande forêt où coexistent, avec *G. nashi*, *G. tabaniformis* West., *G. hanningtoni* Newst. et Evans et *G. newsteadi* Aust.

## BIBLIOGRAPHIE

- (1) POTTS (W. H.). — A new tsetse-fly from the British Cameroons. *Ann. trop. Med. Parasit.*, 1955, 49, 218-226.

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
ET TECHNIQUE OUTRE-MER  
47, bld des Invalides  
PARIS VII<sup>e</sup>

COTE DE CLASSEMENT N° 2361

ENTOMOLOGIE MEDICALE ET VETERINAIRE

PRESENCE DE GLOSSINA NASHI POTTS 1955 EN AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE

par

L.MAILLOT et R.TAUFLIEB

O.R.S.T.O.M. Fonds Documentaire

N° : 28949 ex 1

Cote : B

Bull.Soc.Pathol.exot.  
1955, 48, 6, p.847-48