

LE PARC NATIONAL DU NIOKOLO-KOBA
(Sénégal)

FASCICULE III


mhp 31

XXXI. OISEAUX
(note additionnelle)

par Gérard MOREL et André DUPUY

IFAN-DAKAR

Janvier 1969



Fonds Documentaire ORSTOM
Cote : BX 4666 ex 1

XXXI. OISEAUX (note additionnelle)

par Gérard MOREL (1) et André DUPUY (2)

La présente note a pour objet de continuer l'inventaire commencé par P.L. DEKEYSER et publié dans les deux précédents mémoires parus sur le Parc national du Niokolo-Koba (DEKEYSER, 1956 et 1962).

L'un des auteurs (A.D.) a parcouru des milliers de kilomètres dans le cadre de ses activités professionnelles entre avril 1967 et juin 1968 ; mais son attention se tourna surtout sur les espèces faciles à déterminer ou spectaculaires, de même que sur les migrateurs paléarctiques avec lesquels il était plus familiarisé. L'autre (G.M.) consacra une mission d'une douzaine de jours, du 24 juin au 4 juillet 1967, à l'inventaire de l'avifaune du Parc. Ces observations contribuent à augmenter sensiblement la liste établie par DEKEYSER : de 171 espèces elle passe à 230. Il faut admettre cependant que la liste est loin d'être close. A cet égard, il est indispensable de consulter les notes de CAWKELL et MOREAU sur les oiseaux de Gambie.

Afin de respecter l'homogénéité dans la parution des fascicules, nous avons adopté la même séquence systématique que DEKEYSER.

Famille de PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus LINNÉ.

Pélican blanc

Un groupe de 8 était installé sur une mare à Oudassi le 7 février 1968 à 18 h. (A.D.).

Famille des ARDEIDAE

Ardea goliath CRETZSCHMAR.

Héron goliath

Un exemplaire a été vu le 2 mai 1968 à 10 h en train de pêcher sur l'étang de Siminti (A.D.).

Ardea purpurea LINNÉ.

Héron pourpre

Observé 11 oiseaux du 7 au 15 mai 1967 sur les mares, notamment celle de Siminti. Compte tenu de

(1) Directeur de Recherches à l'ORSTOM, station ORSTOM d'Ornithologie de Richard-Toll (Sénégal).

(2) Conservateur du Parc National du Niokolo-koba.

la saison, nous avons à faire vraisemblablement à des oiseaux subadultes en déplacements erratiques conformes à la biologie de cette espèce (A.D.).

Famille des CICONIIDAE

Ciconia ciconia ciconia LINNÉ.

Cigogne blanche

1 exemplaire posé à la mare de Sita Ndi le 7 mai 1967. Il s'agissait là sans aucun doute d'un oiseau non parvenu à maturité sexuelle et peu pressé de remonter vers le nord (A.D.).

Famille des PLATALEIDAE

Platalea alba SCOPOLI.

Spatule blanche d'Afrique

Ce bel oiseau spectaculaire avec son bec rougeâtre a été noté au nombre de 6 le 12 mai 1967 à 19 h sur la mare de Woïni. 3 spécimens ont également été observés le 19 avril 1968 à 11 h sur la mare de Sita Ndi (A.D.).

Famille des LARIDAE

Rhynchops flavirostris VIEILLOT.

Bec-en-ciseaux

Lors de notre dernier recensement de faune le 13 juin 1968, nous avons pu observer plusieurs Becs-en-ciseaux sur la Gambie, notamment au lieu-dit « le Point de Vue » (Sita Ouléon To). L'ensemble des contacts visuels porte à 11 le nombre des oiseaux de cette espèce observés au cours de la journée (A.D.).

C'est la première mention de l'espèce pour cette partie du Sénégal. La présence de ces oiseaux, tous adultes, montre que la reproduction était déjà terminée dans la région alors qu'elle se prolonge davantage dans d'autres régions d'Afrique.

Famille des GLAREOLIDAE

Glareola pratincola boweni BANNERMAN.

Glaréole d'Afrique

Nous avons noté à deux reprises cette sous-espèce. Une dizaine d'oiseaux le 2 mai 1967 au gué de Ba Foula Bé ; 3 le 11 mai à 19 h à la mare de Sita Ndi (A.D.).

Famille des CHARADRIIDAE

Himantopus himantopus (LINNÉ).

Echasse blanche

Il est étonnant que cette espèce caractéristique ait échappé jusqu'ici aux observateurs qui nous ont

précédé. En effet, nous avons pu l'observer en nombre sur toutes les mares entre le 6 et le 13 mai 1967. Il est vrai que le passage peut être bref, ce qui pourrait expliquer son absence sur les listes précédemment publiées. (A.D.).

Charadrius forbesi (SHELLEY).

Pluvier à triple collier de Forbes

Un couple près de flaques d'eau sur la route près de Niokolo-Koba. Une femelle collectée, le 4 juillet 1967 (G.M.).

Tringa totanus totanus LINNÉ.

Chevalier gambette

Un oiseau en plumage nuptial noté le 12 mai 1967 à 9 h du matin sur la mare de Siminti. Il s'agissait sans aucun doute d'un oiseau en déplacement pré-nuptial (A.D.).

Famille des OTIDIDAE

Lissotis melanogaster (RÜPPEL).

Grande Outarde à ventre noir

Il est surprenant que cet oiseau de grande taille n'ait pas été noté avant nous. D'observation commune pendant la saison des pluies, il disparaît en saison sèche. Nous avons affaire à un migrateur de type éthiopien et nous sommes en mesure d'affirmer sa nidification dans les limites du Parc ; nous avons noté les premiers couples fin juin (G.M.). L'espèce était encore commune en octobre comme le prouvent les 15 oiseaux recensés le 19 octobre 1967 (A.D.). Il semble que l'espèce se trouve remplacée en saison sèche, par l'outarde de Denham (*Neotis cafra denhami*), dont de nombreux spécimens ont été observés du 8 au 17-XII-1967 sur tous les bowé importants du Parc national (A.D.).

Famille des PHASIANIDAE

Coturnix coturnix coturnix (LINNÉ).

Caille d'Europe

Nous avons pu noter le 10-XII-1967 à 9 h 20 sur la piste de Niokolo-Koba à Bangaré et à quelques kilomètres avant ce lieu une caille d'Europe ! Cette observation met en évidence le caractère migratoire de cet oiseau paléarctique ainsi qu'un hivernage certain de cette espèce en zone soudanienne avec une ampleur qui reste à définir. Le baguage systématique serait d'un grand secours (A.D.).

Famille des COLUMBIDAE

Vinago australis (LINNÉ).

Pigeon vert à front nu

Rencontré assez communément aux environs de Badi et de Niokolo-Koba dans les galeries (G.M.).

***Turtur abyssinica delicatula* (SHARPE).**

Petite Tourterelle à bec noir

Nous n'avons noté aucune différence de biotope appréciable pour séparer cette espèce de *Turtur afer*. Les deux espèces semblent aussi communes. Le statut de ces deux espèces si faciles à confondre mérite de plus amples observations (G.M.).

***Streptopelia semitorquata erythrophrys* (SWAINSON).**

Tourterelle à collier d'Afrique

Commune à Badi et à Niokolo-Koba (G.M.).

Famille des FALCONIDAE

***Neophron percnopterus* (LINNÉ).**

Néophron percnoptère

Un adulte planait au-dessus de la Gambie à Wouroli le 6 février 1968 à 13 h (A.D.).

***Torgos tracheliotus nubicus* (SMITH).**

Vautour Oricou

Nous avons eu la grande joie d'observer 2 exemplaires de cette très belle espèce le 15 avril 1967 au lieu-dit « la Patte d'Oie ». Les oiseaux étaient posés sur un arbre, attirés sans doute par les nombreux cadavres de mammifères laissés par un récent et important incendie (A.D.).

***Buteo auguralis* SALVADORI.**

Buse à queue rousse

Un sujet immature collecté près de Badi le 28 juin 1967 (G.M.).

***Butastur rufipennis* (SUNDEVALL).**

Buse des sauterelles

Observé un sujet près de Niokolo-Koba, le 1^{er} juillet 1967 (G.M.).***Aquila rapax* (TEMMINCK).**

Aigle ravisseur

Cet aigle indolent, aux allures de buse, est assez fréquemment observé dans les limites du Parc. De par son écologie, on le trouve plus régulièrement sur les parties ouvertes, posté en surveillance (A.D.).

Polemaetus bellicosus (DAUDIN).

Aigle martial

Plusieurs couples de cette espèce existent dans le Parc. La grande taille de l'oiseau et sa poitrine sombre, très caractéristique, permettent facilement son identification *in natura*. Un bel exemplaire a en particulier été noté le 13 juin 1968 volant au-dessus du Parc (A.D.).

Circus aeruginosus (LINNÉ).

Busard Harpaye

Deux exemplaires ont été observés le 2 décembre 1967, l'un à Wassa Dou vers 10 h 30, l'autre à Siminti vers 12 h 30. Un mâle adulte a de plus été vu en train de chasser sur la mare de Diamwel le 30 janvier 1968 en fin de matinée (A.D.).

Pandion haliaetus haliaetus (LINNÉ).

Balbuzard fluviatile

Nous avons observé un Balbuzard sur la Gambie le 5 avril 1967, le matin, au lieu-dit « le Point de Vue » (Sita Ouléon To). Cette observation est à rapprocher de celle de BANNERMAN faite en Gambie (A.D.).

Famille des STRIGIDAE

Bubo africanus cinerascens GUÉRIN.

Grand-Duc africain

Un sujet observé la nuit à la lumière des phares de voiture sur la route près de Niokolo-Koba, le 4 juillet 1967 (G.M.).

Famille des CUCULIDAE

Cuculus solitarius STEPHENS.

Cocou solitaire

Cette espèce dont le chant porte très loin a été entendue à plusieurs reprises sur la Gambie et enfin collectée à Niokolo-Koba le 3 juillet 1967 : femelle avec un œuf prêt à pondre (G.M.).

Lampromorpha caprius (BODDAERT).

Cocou Didric

Entendu assez fréquemment aux environs de Badi (G.M.).

Famille des PICIDAE

Dendropicos obsoletus obsoletus (WAGLER).

Petit Pic à dos brun

1 exemplaire observé et collecté près de Niokolo-Koba, le 2 juillet 1967 (G.M.).

Famille des CAPITONIDAE

Pogoniulus chrysoconus chrysoconus (TEMMINCK).

Barbu à front jaune

1 sujet observé près de Niokolo-Koba, le 2 juillet 1967 (G.M.).

Famille des CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus inornatus HEUGLIN.

Engoulevent terne

Il est particulièrement étonnant que cette espèce extrêmement commune dans le Parc national n'ait pas été notée jusqu'ici. Cela peut s'expliquer par le fait que sa présence est saisonnière. Les premiers spécimens ont été notés début novembre 1967. D'observation commune dès la tombée de la nuit, nous avons pu en noter jusqu'à 67 sur la route entre Niokolo-Koba et Tambakounda. Un mâle adulte a été collecté fin novembre et a été naturalisé (A.D.).

Macrodipteryx longipennis (SHAW).

Engoulevent à balanciers

Déjà signalée à notre attention par M. CONDAMIN et R. ROY qui nous avaient affirmé avoir vu à différentes reprises et en particulier en janvier 1965 cette espèce très caractéristique dans le Parc, nous avons eu enfin la joie d'en observer un le 22 janvier 1968 à 18 h 45 sur la piste du Doufouroun (A.D.).

Famille des APODIDAE

Apus apus (LINNÉ).

Martinet noir

Nous avons noté de très gros vols en déplacements migratoires les 13, 14 et 15 mai 1967 au matin. Les observations ont toutes été faites sur la Gambie à Siminti (A.D.).

Apus caffer LICHTENSTEIN.

Petit Martinet à croupion blanc

Une petite colonie était installée sous le pont de Niokolo-Koba, occupant les nids d'*Hirundo abyssinica*, comme il est fréquent chez cette espèce. 1 spécimen a été collecté (G.M.).

Famille des MEROPIDAE

Dicrocercus hirundineus chrysolaimus (JARDINE et SELBY).

Guêpier à queue d'hirondelle

Observé 1 seul sujet près de Niokolo-Koba, le 2 juillet 1967 (G.M.).

Famille des **ALCEDINIDAE****Halcyon leucocephala leucocephala** (MÜLLER).

Martin-Pêcheur à tête grise

1 sujet observé près de Niokolo-Koba le 2 juillet 1967 (G.M.).

Halcyon chelicuti (STANLEY).

Martin-Pêcheur strié

Entendu plusieurs fois près de Badi (G.M.).

Famille des **UPUPIDAE****Upupa epops senegalensis** SWAINSON.

Huppe du Sénégal

Observée solitaire à deux reprises : le 27 avril, un oiseau sur la piste de Badi ; le 3 mai 1967, un autre au lieu-dit la « Patte d'Oie » (A.D.).

Famille des **MUSCICAPIDAE****Hylota flavigaster flavigaster** SWAINSON.

Gobe-mouches à ventre jaune

Observé une paire près de Niokolo-Koba, le 1^{er} juillet 1967 (G.M.).Famille des **SYLVIIDAE****Sylvietta brachyura** LAFRESNAYE.

Fauvette Crombec

1 sujet observé près de Niokolo-Koba le 4 juillet 1967 (G.M.).

Agrobates galactotes (TEMMINCK).

Agrobate rubigineux

Nous avons observé à plusieurs reprises et tout au long de l'année, des oiseaux appartenant à cette espèce. Il ne nous a pas été possible *in natura* de déterminer de quelle race il s'agissait ; mais il apparaît que dès novembre les contacts visuels étaient plus nombreux. Il est vraisemblable que la race *minor* sédentaire est renforcée par un certain contingent de la race *galactotes*, migratrice (A.D.).

Cisticola erythrops (HARTLAUB).

Cisticole à face rousse

1 spécimen collecté près de Badi le 27 juin 1967 (G.M.).

***Cisticola lateralis* (FRASER).**

Cisticole siffleuse

1 spécimen collecté près de Niokolo-Koba ; les mâles chantaient nombreux (G.M.).

Tamille des TURDIDAE

***Turdus libonyanus chiguancoides* SEEBOHM.**

Grive Kurrichane

Commune et familière à Badi et à Niokolo-Koba. 1 mâle collecté dont les gonades étaient très développées (G.M.).

***Oenanthe oenanthe* (LINNÉ).**

Traquet motteux

Nous avons observé à deux reprises cette espèce sur des bowé de la région de Niokolo-Koba, notamment le 17-XII-1967 au matin. Cette espèce holarctique est connue pour venir hiverner dans l'ouest-africain. Il est vraisemblable que les oiseaux appartiennent à la sous-espèce *Oenanthe oenanthe leucorhoa* (GMELIN) citée de Sénégambie par BANNERMAN (A.D.).

***Pentholaea albifrons frontalis* (SWAINSON).**

Traquet noir à front blanc

Observé 1 mâle près de Niokolo-Koba le 1^{er} juillet 1967 (G.M.).

***Cossypha niveicapilla niveicapilla* (LAFRESNAYE).**

Petite Cossyphe à tête blanche

Très commun, particulièrement à Badi et Niokolo-Koba où son chant remarquable le signalait à l'attention. Une femelle collectée à Badi le 24 juin 1967 avait un œuf prêt à pondre (G.M.).

***Luscinia svecica* (LINNÉ).**

Gorge-bleue

Observé une seule fois début janvier 1968 sur la mare de Kandi Kandi, ce migrateur de type paléarctique est connu pour l'ampleur de sa migration. Ses quartiers d'hiver englobent le bloc guinéen, le Sénégal et la vallée du Niger. Il était donc normal de rencontrer l'espèce au Parc du Niokolo-Koba. Le fait qu'elle ne figurait pas jusqu'ici sur les listes d'oiseaux observés peut s'expliquer par sa discrétion. L'absence d'ornithologiste à l'époque où elle vient hiverner y a également contribué. Cette observation vient étayer celles déjà faites par nos collègues G. MOREL et F. ROUX réalisées plus au Nord. Enfin F. DUHART et M. DESCAMPS ont noté l'espèce en 1963, installée en hivernage en trois points de la vallée du Niger (A.D.).

Famille des LANIIDAE

Nilaus afer afer LATHAM.

Pie-grièche Brubru

Vu et entendu à plusieurs reprises autour de Badi en juin-juillet 1967 (G.M.).

Famille des HIRUNDINIDAE

Hirundo rufula domicella FINSCH et HARTLAUB.

Hirondelle rousseline

Une seule observée à Niokolo-Koba le 4 juillet 1967. Toutefois, l'espèce est commune à Wassa Dou, sur le Niéri Ko, et niche dans les huttes des villages (G.M.).

Hirundo abyssinica puella TEMMINCK et SCHLEGEL.

Hirondelle à gorge striée

Une colonie était établie sous le pont du Niokolo-Koba près du campement (G.M.).

Psaldoprocne obscura (HARTLAUB).

Hirondelle hérissée

Quelques sujets survolaient le cours d'eau de Niokolo-Koba près du campement ; un mâle collecté le 4 juillet 1967 (G.M.).

Famille des PLOCEIDAE

Ploceus luteolus luteolus (LICHTENSTEIN).

Tisserin minulle

Vu tous les jours à Badi, mais ce Tisserin ne semble jamais très abondant. Les mâles étaient en plumage nuptial. Collecté un mâle le 24 juin 1967 (G.M.).

Ploceus capitalis (LATHAM).

Tisserin à tête noire du Niger

Observé quelques uns en plumage nuptial à Badi (G.M.).

Ploceus vitellinus vitellinus (LICHTENSTEIN).

Tisserin vitellin ou Tisserin à tête rousse

Quelques-uns observés à Niokolo-Koba en plumage nuptial (G.M.).

Ploceus brachypterus brachypterus (SWAINSON).

Tisserin à lunettes

Capturé un mâle en plumage nuptial dans une galerie près de Badi (27 juin 1967) et observé plusieurs fois le nid typique (G.M.).

Coliuspasser macrourus macrourus (GMELIN).

Veuve à dos d'or

Quelques mâles acquérant leur plumage nuptial près de Niokolo-Koba (G.M.).

Vidua macroura (PALLAS).

Veuve dominicaine

Un mâle observé deux fois près de Niokolo-Koba, les 30 juin et 1^{er} juillet 1967 (G.M.).

Famille des ESTRILDIDAE

Lagonosticta coerulescens (VIEILLOT).

Sénégal gris-bleu

Observé une fois à Badi (26 juin 1967) (G.M.).

Famille des MOTACILLIDAE

Motacilla aguimp SUNDEVALL.

Bergeronnette noire et blanche d'Afrique

Deux oiseaux observés le 17-XII-1967 vers 11 h sur les bords de la Gambie au gué de Bangaré. L'espèce est peu commune dans l'Ouest africain et n'est que localement représentée. Elle était inconnue jusqu'à présent du Sénégal et de Gambie, et cette observation peut être considérée comme la première pour cette région d'Afrique (A.D.).

Motacilla flava LINNÉ.

Bergeronnette printanière

Nous avons observé à plusieurs reprises courant janvier 1968, des oiseaux appartenant à cette espèce de statut paléarctique. Sur les mares du Parc, l'espèce évolue en compagnie d'Anatidés et d'Ardéidés. Il semble que la région de Haute Gambie soit la limite sud de son aire d'hivernage pour cette partie de l'Afrique. Ces observations sont à rapprocher de celles mentionnées dans les travaux de G. MOREL et F. ROUX sur les migrateurs paléarctiques au Sénégal et ceux de V.W. SMITH et D. EBBUTT sur la présence de cette espèce au Nigeria (A.D.).

Famille des BUPHAGIDAE

Buphagus africanus africanus LINNÉ.

Pique-bœufs à bec jaune

Rencontré une fois sur des bovins près de Badi, le 25 juin 1967 (G.M.).

APPENDICE : LISTE RÉCAPITULATIVE DES ESPÈCES RECONNUES
DANS LA RÉGION DU NIOKOLO-KOBA

Cette liste a été établie en prenant comme ouvrage de référence « Les Oiseaux de l'Ouest africain », par P.L. DEKEYSER et J.H. DERIVOT, avec cependant quelques petites modifications de nomenclature. Chaque espèce est précédée d'un numéro qui est celui qu'elle a dans l'ouvrage précité, et suivie d'indications entre parenthèses se rapportant aux pages où elle est mentionnée dans les fascicules I, II ou III déjà consacrés à la faune du Niokolo-Koba.

PÉLÉCANIFORMES (3 espèces).

Phalacrocoracidae.

21. *Anhinga rufa rufa* (II, 363).
22. *Phalacrocorax africanus africanus* (II, 363).

Pelecanidae.

30. *Pelecanus onocrotalus* (III, 427).

ARDÉIFORMES (20 espèces).

Plataleidae.

37. *Platalea alba* (III, 428).

Threskiornithidae.

40. *Hagedashia hagedash brevirostris* (I, 85 - II, 364).
44. *Threskiornis aethiopicus aethiopicus* (I, 85 - II, 364).

Ardeidae.

45. *Ardea cinerea* (I, 85 - II, 364).
46. *Ardea goliath* (III, 427).
47. *Ardea melanocephala* (I, 85 - II, 364).
48. *Ardea purpurea* (III, 427).
50. *Ardeola ralloides* (I, 87 - II, 364).
52. *Bubulcus ibis ibis* (I, 86 - II, 364).
53. *Butorides striatus atricapillus* (I, 87 - II, 364).
54. *Egretta alba melanorhyncha* (I, 86 - II, 364).
55. *Egretta garzetta gularis* (I, 86 - II, 364).
56. *Egretta intermedia brachyrhyncha* (I, 86 - II, 364).

Scopidae.

62. *Scopus umbretta umbretta* (I, 87 - II, 364).

Ciconiidae.

65. *Ciconia ciconia ciconia* (III, 428).
67. *Dissoura episcopa microscelis* (II, 364).
68. *Ephippiorhynchus senegalensis* (I, 89 - II, 365).
69. *Ibis ibis* (I, 89 - II, 365).
70. *Leptoptilos crumeniferus* (I, 89 - II, 365).
71. *Sphenorhynchus abdimi* (I, 88 - II, 364).

ANSÉRIFORMES (3 espèces).

Anatidae.

87. *Dendrocygna viduata* (I, 89 - II, 365).
93. *Plectropterus gambensis* (I, 90 - II, 365).
95. *Sarkidiornis melanotos* (I, 90 - II, 365).

LARIFORMES (1 espèce).

Laridae.

122. *Rhynchops flavirostris* (III, 428).

CHARADRIIFORMES (13 espèces).

Glareolidae.

129. *Glareola pratincola boweni* (III, 428).
132. *Pluvianus aegyptius aegyptius* (I, 90 - II, 365).

Charadriidae.

Charadriinae

136. *Afribyx senegalus senegalus* (I, 91 - II, 365).
141. *Charadrius forbesi* (III, 429).
148. *Hoplopterus spinosus* (I, 90 - II, 365).
151. *Stephanibyx lugubris* (I, 91 - II, 365).
152. *Xiphidiopterus albiceps* (I, 91 - II, 365).

Recurvirostrinae

153. *Himantopus himantopus* (III, 428).
154. *Recurvirostra avosetta* (I, 91 - II, 365).

Scolopacinae

155. *Actitis hypoleucos* (I, 92 - II, 365).
177. *Tringa totanus totanus* (III, 429).

Rostratulinae

179. *Rostratula benghalensis benghalensis* (I, 92 - II, 365).

Jacanidae

182. *Actophilornis africanus* (I, 92 - II, 365).

GRUIFORMES (4 espèces).

Burhinidae

186. *Oedicnemus senegalensis senegalensis* (I, 93 - II, 366).

Otididae

191. *Lissotis melanogaster* (III, 429).
193. *Neotis cafra denhami* (II, 366).

Gruidae

196. *Balearica pavonina pavonina* (I, 93 - II, 366).

RALLIFORMES (1 espèce).

Rallidae

204. *Limnocorax flavirostris* (I, 92 - II, 365).

GALLIFORMES (5 espèces).

Numididae.

225. *Numida meleagris galeata* (I, 93 - II, 366).

Phasianidae.

227. *Coturnix coturnix coturnix* (III, 429).
 231. *Francolinus albogularis albogularis* (II, 366).
 232. *Francolinus bicalcaratus bicalcaratus* (I, 94 - II, 366).
 243. *Ptilopachus petrosus petrosus* (I, 96 - II, 366).

COLUMBIFORMES (12 espèces).

Pteroclididae.

245. *Pterocles exustus exustus* (I, 96 - II, 366).
 247. *Pterocles quadricinctus quadricinctus* (II, 366).

Columbidae.

252. *Columba guinea* (I, 97 - II, 367).
 256. *Oena capensis capensis* (I, 99 - II, 367).
 257. *Stigmatopelia senegalensis senegalensis* (I, 98 - II, 367).
 259. *Streptopelia decipiens shelleyi* (I, 99 - II, 367).
 262. *Streptopelia semitorquata erythrophrys* (III, 430).
 264. *Streptopelia vinacea vinacea* (I, 98 - II, 367).
 265. *Turtur abyssinica delicatula* (III, 430).
 266. *Turtur afer afer* (I, 97 - II, 367).
 271. *Vinago australis* (III, 429).
 273. *Vinago waalia* (I, 97 - II, 367).

FALCONIFORMES (25 espèces).

Falconidae

Aegyptiinae.

275. *Gypohierax angolensis* (I, 100 - II, 367).
 278. *Necrosyrtes monachus monachus* (I, 99 - II, 367).
 279. *Neophron percnopterus* (III, 430).
 280. *Pseudogyps africanus* (I, 99 - II, 267).
 281. *Torgos tracheliotus nubicus* (III, 430).
 282. *Trigonoceps occipitalis* (I, 100 - II, 367).

Milvinae

287. *Milvus migrans tenebrosus* (I, 101 - II, 368).

Accipitrinae

289. *Accipiter badius sphenurus* (I, 101 - II, 368).
 296. *Melierax metabates metabates* (I, 101 - II, 368).

Buteoninae.

298. *Butastur rufipennis* (III, 430).
 299. *Buteo auguralis* (III, 430).
 302. *Haliaeetus vocifer clamans* (I, 100 - II, 367).
 303. *Kaupifalco monogrammicus* (II, 368).

Aquilinae.

305. *Aquila rapax* (III, 430).
 311. *Hieraetus spilogaster* (II, 367).
 312. *Lophaetus occipitalis* (I, 100 - II, 367).
 313. *Polemaetus bellicosus* (III, 431).

Circinae.

315. *Circus aeruginosus* (III, 431).

Circaetinae.

320. *Circaetus cinerascens* (I, 103 - II, 368).
 321. *Circaetus cinereus* (I, 102 - II, 368).
 322. *Circaetus gallicus* (I, 102 - II, 368).
 325. *Theratopius ecaudatus* (I, 101 - II, 368).

Falconinae

328. *Falco ardosiaceus* (I, 103 - II, 368).
 331. *Falco chiquera ruficollis* (II, 368).

Pandioninae.

338. *Pandion haliaetus haliaetus* (III, 431).

STRIGIFORMES (4 espèces).

Strigidae.

341. *Bubo africanus cinerascens* (III, 431).
 343. *Bubo lacteus* (I, 104 - II, 368).
 348. *Glaucidium perlatum* (I, 103 - II, 368).
 355. *Otus senegalensis senegalensis* (II, 368).

PSITTACIFORMES (2 espèces).

Psittacidae.

370. *Poicephalus senegalus senegalus* (I, 104 - II, 368).
 371. *Psittacula krameri krameri* (I, 104 - II, 369).

CUCULIFORMES (10 espèces).

Cuculidae.

375. *Centropus grilli grilli* (I, 106 - II, 369).
 378. *Centropus senegalensis senegalensis* (I, 107 - II, 369).
 383. *Clamator cafer* (I, 105 - II, 369).
 384. *Clamator glandarius* (I, 105 - II, 369).
 387. *Cuculus canorus gularis* (I, 105 - II, 369).
 390. *Cuculus solitarius* (III, 431).
 391. *Lampromorpha caprius* (III, 431).
 393. *Lampromorpha klaasi* (I, 106 - II, 369).

Musophagidae.

397. *Crinifer piscator piscator* (I, 108 - II, 369).
 400. *Musophaga violacea* (I, 107 - II, 369).

PICIFORMES (9 espèces)

Picidae.

414. *Campethera punctuligera punctuligera* (I, 108 - II, 369).
 419. *Dendropicos lafresnayi zechi* (I, 108 - II, 369).
 421. *Dendropicos obsoletus obsoletus* (III, 431).
 425. *Mesopicos goertae agmen* (I, 109 - II, 369).

Indicatoridae.

434. *Indicator indicator* (I, 109 - II, 369).
 436. *Indicator minor* (I, 109 - II, 369).

Capitonidae

446. *Lybius dubius* (I, 110 - II, 370).
 451. *Lybius vielloti rubescens* (I, 110 - II, 370).
 453. *Pogoniulus chrysoconus chrysoconus* (III, 432).

CAPRIMULGIFORMES (2 espèces).

Caprimulgidae.

470. *Caprimulgus inornatus* (III, 432).
 477. *Macrodipteryx longipennis* (III, 432).

APODIFORMES (3 espèces).

Apodidae.

486. *Cypsiurus parvus parvus* (I, 110 - II, 370).
 488. *Apus apus* (III, 432).
 490. *Apus caffer* (III, 432).

CORACIADIFORMES (22 espèces).

Coraciidae.

500. *Coracias abyssinicus* (I, 111 - II, 370).
 501. *Coracias cyanogaster* (I, 111 - II, 370).
 503. *Coracias naevius naevius* (I, 111 - II, 370).
 504. *Eurystomus glaucurus afer* (I, 112 - II, 370).

Meropidae

507. *Dicrocercus hirundineus chrysolaimus* (III, 432).
 508. *Melittophagus bullocki bullocki* (I, 112 - II, 370).
 512. *Melittophagus pusillus pusillus* (II, 370).
 517. *Merops nubicus* (I, 113 - II, 370).
 518. *Merops orientalis viridissimus* (I, 113 - II, 370).

Alcedinidae

522. *Ceryle rudis rudis* (I, 114 - II, 371).
 523. *Corythornis cristata cristata* (I, 114 - II, 371).
 527. *Halcyon chelicuti* (III, 433).
 528. *Halcyon leucocephala leucocephala* (III, 433).
 529. *Halcyon malimbicus torquatus* (I, 115 - II, 371).
 530. *Halcyon senegalensis senegalensis* (I, 114 - II, 371).
 531. *Ispidina picta picta* (II, 371).
 523. *Megaceryle maxima maxima* (I, 113 - II, 371).

Bucerotidae

534. *Bucorvus abyssinicus* (I, 116 - II, 371).
 543. *Tockus erythrorhynchus erythrorhynchus* (I, 115 - II, 371).
 547. *Tockus nasutus nasutus* (I, 115 - II, 371).

Upupidae

551. *Phoeniculus purpureus senegalensis* (I, 116 - II, 371).
 555. *Upupa epops epops* (I, 116 - II, 371).
 555. *Upupa epops senegalensis* (III, 433).

PASSERIFORMES (91 espèces)

Muscicapidae

574. *Batis senegalensis* (I, 117 - II, 372).

584. *Erranornis longicauda longicauda* (I, 118 - II, 372).

587. *Ficedula hypoleuca hypoleuca* (I, 117 - II, 371).

590. *Hyltiota flavigaster flavigaster* (III, 433).

594. *Melaenornis edoloides edoloides* (I, 117 - II, 371).

598. *Parisoma plumbeum plumbeum* (II, 375).

602. *Platysteira cyanea cyanea* (I, 118 - II, 372).

613. *Tchitreia viridis viridis* (I, 118, - II, 372).

Sylviidae

621. *Agrobates galactotes* (III, 433).

644. *Camaroptera brevicaudata brevicaudata* (I, 120 - II, 372).

645. *Camaroptera chloronota* (I, 120 - II, 372).

654. *Cisticola cantans swanzii* (I, 121 - II, 373).

657. *Cisticola erythrops* (III, 433).

663. *Cisticola lateralis* (III, 434).

664. *Cisticola natalensis strangei* (I, 121 - II, 373).

666. *Cisticola rufa* (I, 121 - II, 373).

674. *Eremomela pusilla* (I, 119 - II, 372).

676. *Heliolais erythroptera erythroptera* (I, 122 - II, 373).

681. *Herpystera superciliosa subflava* (I, 122 - II, 373).

683. *Hippolais pallida* (II, 372).

684. *Hippolais polyglotta* (I, 119, II, 372).

688. *Melocichla mentalis mentalis* (I, 122 - II, 373).

691. *Phylloscopus collybita collybita* (II, 373).

702. *Sylvia communis communis* (I, 119 - II, 372).

707. *Sylvietta brachyura* (III, 433).

Turdidae

721. *Cossypha albicapilla albicapilla* (I, 123 - II, 373).

727. *Cossypha niveicapilla niveicapilla* (III, 434).

737. *Luscinia svecica* (III, 434).

752. *Oenanthe oenanthe* (III, 434).

753. *Pentholaea albifrons frontalis* (III, 434).

755. *Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* (I, 123 - II, 373).

762. *Turdus libonyanus chiguancoides* (III, 434).

Timaliidae

784. *Turdoides plebeja platycircus* (I, 123 - II, 373).

785. *Turdoides reinwardi reinwardi* (I, 124 - II, 374).

Pycnonotidae

809. *Pycnonotus barbatus inornatus* (I, 124 - II, 374).

810. *Pyrrhurus flavicollis flavicollis* (I, 125 - II, 374).

Campephagidae

818. *Campephaga phoenicea* (I, 125 - II, 374).

Dicruridae

825. *Dicrurus adsimilis adsimilis* (I, 125 - II, 374).

Laniidae

834. *Corvinella corvina corvina* (I, 127 - II, 374).

837. *Dryoscopus gambensis gambensis* (I, 126 - II, 374).

840. *Laniarius barbarus barbarus* (I, 126 - II, 374).

680. *Malaconotus poliocephalus poliocephalus* (I, 127 - II, 374).
 863. *Nilaus afer afer* (III, 435).
 866. *Tchagra senegala senegala* (II, 375).
- Prionopidae
 868. *Prionops plumata plumata* (I, 128 - II, 374).
- Paridae
 877. *Parus niger guineensis* (I, 128 - II, 375).
- Hirundinidae
 880. *Hirundo abyssinica puella* (III, 435).
 883. *Hirundo rufula domicella* (III, 435).
 888. *Hirundo semirufa gordonii* (I, 128 - II, 375).
 896. *Psalidoprocne obscura* (III, 435).
- Nectarinidae
 917. *Anthreptes longuemarei longuemarei* (I, 129 - II, 375).
 924. *Chalcomitra senegalensis senegalensis* (I, 129 - II, 375).
 943. *Hedydipna platura* (I, 130 - II, 375).
 946. *Nectarinia pulchella pulchella* (I, 130 - II, 375).
- Zosteropidae
 952. *Zosterops senegalensis senegalensis* (I, 131 - II, 375).
- Fringillidae
 958. *Emberizia forbesi nigeriae* (I, 132 - II, 376).
 965. *Passer griseus griseus* (I, 131 - II, 376).
 975. *Serinus mozambicus caniceps* (I, 132 - II, 376).
- Bubalornithidae
 982. *Bubalornis albirostris albirostris* (I, 132 - II, 376).
- Ploceidae
 991. *Coliuspasser macrourus macrourus* (III, 436).
 1007. *Euplectes orix franciscana* (I, 134 - II, 376).
 1063. *Plesiositagra cucullata* (I, 133 - II, 376).
 1010. *Ploceus brachypterus brachypterus* (III, 436).
 1065. *Ploceus vitellinus vitellinus* (II, 435).
 1073. *Ploceus capitalis* (III, 435).
 1074. *Ploceus luteolus luteolus* (III, 435).
 1076. *Ploceus monachus* (I, 133 - II, 376).
1082. *Steganura orientalis aucupum* (I, 137 - II, 377).
 1087. *Vidua macroura* (III, 436).
- Estrildidae
 977. *Amauresthes fringilloides* (I, 184 - II, 376).
 995. *Estrilda melpoda melpoda* (I, 137 - II, 377).
 1020. *Lagonosticta coerulescens* (III, 436).
 1026. *Lagonosticta rufopicta rufopicta* (I, 136 - II, 376).
 1027. *Lagonosticta senegala senegala* (I, 135 - II, 376).
 1028. *Lagonosticta vinacea* (I, 136 - II, 377).
 1070. *Phytalia phoenicoptera phoenicoptera* (I, 135 - II, 376).
 1077. *Spermestes cucullatus cucullatus* (I, 134 - II, 376).
 1086. *Uraeginthus bengalus* (I, 136 - II, 377).
- Alaudidae
 1103. *Heliocorys modesta nigrita* (I, 138 - II, 377).
- Motacillidae
 1118. *Anthus leucophrys zenkeri* (I, 138 - II, 377).
 1125. *Motacilla aguimp* (III, 436).
 — . *Motacilla flava* (III, 436). Cette espèce a été reconnue dans l'Ouest africain depuis la rédaction de l'ouvrage de DEKEYSER et DERIVOT.
- Buphagidae
 1129. *Buphagus africanus africanus* (III, 436).
- Sturnidae
 1130. *Cinnyricinclus leucogaster leucogaster* (II, 377).
 1134. *Lamprocolius chalcurus chalcurus* (I, 139 - II, 377).
 1136. *Lamprocolius chloropterus chloropterus* (I, 139 - II, 377).
 1141. *Lamprocolius purpureus purpureus* (I, 139 - II, 377).
 1143. *Lamprotornis caudatus* (I, 138 - II, 377).
- Oriolidae
 1152. *Oriolus auratus auratus* (I, 140 - II, 378).
- Corvidae
 1157. *Corvus albus* (I, 140 - II, 378).
 1159. *Ptilostomus afer* (I, 141 - II, 378).

Au total 230 espèces réparties en 18 ordres et 58 familles.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BANNERMAN D.A. — Birds of tropical West Africa ; The Crown Agent for the Colonies, 8 vol., 1930-1951.
 BANNERMAN D.A. — The Birds of West and Equatorial Africa ; *Edinburgh & London*, Oliver & Boyd, 2 vol, 1953.
 CAWKELL E.M. — Notes on Gambian birds ; *Ibis*, 107, 1965, pp. 535-540.

- CAWKELL E.M. et MOREAU R.E. — Notes on birds in the Gambia ; *Ibis*, 106, 1963, pp. 156-178.
- DEKEYSER, P.L. — Le Parc national du Niokolo-Koba (1^{er} fascicule), IV. Oiseaux, *Mém. IFAN*, n° 48, 1956, pp. 79-141.
- DEKEYSER P.L. — Le Parc national du Niokolo-Koba (2^e fascicule), XXXVI. Oiseaux, note récapitulative ; *Mém. IFAN*, n° 62, 1962, pp. 363-378.
- DEKEYSER P.L. et DERIVOT J.H. — Les oiseaux de l'Ouest africain ; *Dakar, IFAN, Initiations et Etudes africaines* n° XIX, 3 fascicules, 1966-1968.
- DUHART F. et DESCAMPS M. — Notes sur l'avifaune du delta central nigérien et des régions avoisinantes ; *l'Oiseau*, v. 33, 1963, numéro spécial, 107 p., 1 carte.
- MOREL G. et ROUX F. — Les migrateurs paléarctiques au Sénégal, II, Passereaux et synthèse générale ; *La Terre et la Vie*, n° 2, 1966, pp. 143-176.
- SMITH V.W. et EBUTT D. — Notes on yellow Wagtails *Motacilla flava* wintering in Central Nigeria ; *Ibis*, 107, 1965, pp. 390-393.