

**LES ANIMAUX
DE
MADAGASCAR**

OISEAUX

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER
CENTRE DE TANANARIVE

Ces fiches ont été réalisées sous le haut patronage de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, grâce à l'aide généreuse de la « New York Zoological Society » par M. Malzy, Chef de la Division de Zoologie du Centre O.R.S.T.O.M. de Tananarive, avec la collaboration de Mrs Jolly, de la « New York Zoological Society » de l'Institut Pédagogique de Tananarive et de MM. Randrianasolo, Ranjato, Randriamanantsoa, techniciens O.R.S.T.O.M.

AVANT-PROPOS

L'Ile de Madagascar est séparée depuis longtemps, plusieurs millions d'années, des continents voisins. Les animaux qui l'habitent ont donc une origine très ancienne et, pour la plupart, n'existent pas dans les autres parties du monde.

Cette faune si particulière et le couvert végétal qui l'abrite constituent pour Madagascar une richesse scientifique de grande valeur. Malheureusement, au cours des âges, des destructions importantes ont été causées par l'homme envers la forêt malgache et envers les animaux qui y vivent. Actuellement, la situation est grave et nous risquons de voir totalement disparaître, d'ici quelques dizaines d'années, ce qui reste encore de cette flore et de cette faune uniques au monde.

Des mesures législatives ont été prises pour remédier à cet état de chose, mais elles doivent être complétées par une éducation des jeunes et l'action que vous pouvez exercer dans ce domaine est de grande importance.

En contact direct avec les éléments de la population d'âge scolaire, vous pouvez mieux que quiconque leur faire connaître les plantes et les animaux de leur pays, leur apprendre à les aimer et à les respecter, leur donner la connaissance de ce que représentent cette faune et cette flore en tant que richesse scientifique, typiquement malgache.

C'est pour vous aider dans cette tâche que nous avons établi ces fiches. Elles vous permettront de donner un enseignement des Sciences Naturelles en partant de la faune locale.

Elles vous permettront, d'autre part, de participer à l'amélioration de nos connaissances. Vos observations personnelles et celles de vos élèves seront précieuses. Portez votre attention en particulier sur les points suivants :

- L'animal décrit existe-t-il dans votre région ?
- Est-il très fréquent ? Est-il moins répandu à certaines époques de l'année ?
- Etait-il plus répandu autrefois ?
- A-t-il totalement disparu ? Pourquoi ? La chasse, les carnassiers...
- Dans quel milieu le rencontre-t-on le plus souvent : bord de l'eau, sur les arbres...
- De quoi se nourrit-il ?
- Avez-vous des remarques à faire à propos de sa reproduction : époque, modification de comportement, fécondité...
- Le nom malgache utilisé dans votre village est-il celui de la fiche ?
- Cet animal a-t-il un intérêt pratique : consommation, utilisation de la peau, médicament, etc...
- Etait-il, autrefois, considéré comme « fady » ?

Les renseignements que vous réunirez, devront être adressés, par la voie hiérarchique, au Ministère de l'Education Nationale. Le Ministère les transmettra au département de la Recherche de l'Institut Pédagogique et à la Division de Zoologie du Centre O.R.S.T.O.M. de Tananarive, B.P. 434, qui se chargera d'utiliser au mieux la documentation ainsi réunie.

P. MALZY.


OISEAUX (50)

<i>Sterna caspia</i>	Pettersson	— p. 185-193
<i>Sterna bergii</i>	Watson	— pl. 4
<i>Phalacrocorax africanus</i>	d'après nature	
<i>Anhinga vulsini</i>	{ Austin Singer — p. 45	
	{ d'après nature	
<i>Ardea purpurea</i>	{ Austin Singer — p. 51	
	{ Pettersson — p. 44	
<i>Ardea cinerea</i>	{ Austin Singer — p. 50	
	{ Pettersson — p. 44	
<i>Egretta alba</i>	Austin Singer — p. 51	
<i>Egretta dimorpha</i>	Austin Singer — p. 52	
<i>Melanophoyx ardesiaca</i>	{ Austin Singer — p. 51	
	{ Grand. — pl. 225	
<i>Bubulcus ibis</i>	Austin Singer — p. 51	
<i>Platalea alba</i>	Grand. — pl. 215	
<i>Plegadis falcinellus</i>	Austin Singer — p. 59	
<i>Threskiornis æthiopica</i>	{ Grand. — pl. 219	
	{ Austin Singer — p. 59	
<i>Lophotibis cristata</i>	Grand. — pl. 223	
<i>Phœnicopterus ruber</i>	Austin Singer — p. 61	
<i>Phœniconaias minor</i>	Austin Singer — p. 61	
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Grand. — pl. 267	
<i>Nettapus auritus</i>	Grand. — pl. 264	
<i>Dendrocygna viduata</i>	Austin Singer — p. 68	
<i>Dendrocygna fulva</i>	Grand. — pl. 272	
<i>Capella macrodactyla</i>	Austin Singer — p. 122	
<i>Rostratula benghalensis</i>	Austin Singer — p. 117	
<i>Gallinula chloropus</i>	{ Austin Singer — p. 109	
	{ Grand. — pl. 240	
<i>Porphyrio madagascariensis</i>	Grand. — pl. 242	
<i>Margaroperdix madagascariensis</i>	Grand. — pl. 199-200	
<i>Numida mitrata</i>	{ Grassé — p. 915	
	{ Grand. — pl. 204	
<i>Alectroenas madagascariensis</i>	Grand. — pl. 193	
<i>Vinago australis</i>	{ Austin Singer — p. 143	
	{ Grand. — pl. 190	
<i>Streptopelia picturata</i>	Grand. — pl. 185	
<i>Oena capensis</i>	Grand. — pl. 188	
<i>Falco peregrinus</i>	Austin Singer — p. 84	
<i>Falco newtoni</i>	Grand. — pl. 13	
<i>Coracopsis vasa</i>	Grand. — pl. 1	
<i>Corapsis nigra</i>	Grand. — pl. 3	

<i>Coua caerulea</i>	Grand.	— pl. 48
<i>Coua cristata</i>	Grand.	— pl. 44
<i>Eurystomus glaucurus</i>	Grand.	— pl. 80
<i>Uratelornis chimæra</i>	Lavauden	— pl. 7
<i>Merops superciliosus</i>	Grand.	— pl. 90
<i>Corythornis vintsioides</i>	Grand.	— pl. 90
<i>Ispidina madagascariensis</i>	Grand.	— pl. 89
<i>Upupa epops</i>	{ Grand.	— pl. 93
	{ Austin Singer	— p. 181
<i>Dicrurus forficatus</i>	Grand.	— pl. 152
<i>Artamella viridis</i>	Grand.	— pl. 154
<i>Vanga curvirostris</i>	Grand.	— pl. 166
<i>Euryceros prevostii</i>	Grand.	— pl. 172
<i>Falcula palliata</i>	Grand.	— pl. 117
<i>Zosterops maderaspatana</i>	Austin Singer	— p. 281
<i>Foudia madagascariensis</i>	Grand.	— pl. 181
<i>Foudia sakalava</i>	Grand.	— pl. 178

La Sterne Caspienne ou Tchegrava

Nom (s) malgache (s) —



d'après O. Austin

Grande taille, 52 centimètres de longueur.

Plumage de noces : corps blancs et gris-bleu – tête noire – bec rouge – pattes noires palmées.


Sexes semblables.

Ailes longues et pointues – queue légèrement échancrée.

Se nourrit de poissons.

Solitaire ou par couple.

Très bon voilier : « hirondelle de mer ».



Sterna caspia Pallas.


Famille Laridæ

Rencontré près des côtes. Peu fréquent.

Migrateur. Très large répartition dans le monde. Niche dans l'hémisphère boréal.

La Sterne Huppée ou Sterne de Berg

Nom (s) malgache (s) — Kirininy



d'après O. Austin

50 centimètres de long.

Plumage de noces : blanc et gris – tête noire avec bandeau blanc sur le front – huppe en arrière – bec jaune – pattes noires palmées.


Ailes longues et pointues – queue moyennement fourchue.

Sexes semblables.

Se nourrit de poissons.

Nidification sur le sable en avril, en colonies importantes.

Très bon voilier (« hirondelle de mer ») mais médiocre nageur.



Sterna bergii Lichtenstein.

Famille Laridæ.

Commun sur les côtes Nord, Ouest et Sud-Ouest.

Vaste répartition sur les côtes de l'océan Indien et de l'océan Pacifique.

Le Cormoran


Nom (s) malgache (s) — Voropisaka (Hovas)
Vadimboay
Kontomboay
Voromboay



Oiseau strictement aquatique — plumage sombre, gris et noir — dos roux — cou long — bec crochu à son extrémité — pattes palmées noires, environ 58 centimètres de long.

Nage le corps immergé : plumage non imperméable — pour se sécher, se perche ailes étendues — Plonge avec facilité — Vol puissant, cou tendu — Se nourrit de poissons, grenouilles, insectes aquatiques.

Nidification en août — Nids groupés sur rochers ou dans arbres bas.



Phalacrocorax africanus Bangs.

Famille Phalacrocoracidae.

Marais, rivières et lacs de 0 à 1.500 mètres d'altitude. Solitaire mais parfois groupements de nombreux individus.

Assez commun.

L'Anhinga ou Oiseau-Serpent

Nom (s) malgache (s) — Vadimboay
Ramagnara
Fangalamotimboay
Voromboay




d'après D. MESTIN A. SIMON

Oiseau au plumage sombre, gris et noir – cou très long, bec noir, droit et pointu – pattes robustes, gris-jaune, palmées – Environ 95 centimètres de long.

Strictement aquatique – plonge avec facilité – nage le corps immergé : plumage non imperméable – pour se sécher se perche ailes étendues – Vol lourd mais rapide – Souvent perché solitaire au bord de l'eau, cou replié en S – Se nourrit presque exclusivement de poissons.

Nidification en août-septembre – Nids groupés en petites colonies sur des arbres.



Anhinga vulsini Bangs.

Famille *Phalacrocoracidae*.

Lacs et rivières entre 0 et 1.200 mètres dans l'Est, l'Ouest et le Nord-Ouest (Sambirano).


Le Héron Pourpré

Nom (s) malgache (s) — Langaraka
Rangora
Dangorovano



Grande taille – Longueur : 0,90 mètre – dos gris – dessous brun roux – tête noire – long bec, droit et conique – Cou long, très flexible – pattes longues et grêles – Sexes semblables.

Aquatique – se nourrit de poissons, insectes, batraciens, crustacés – Craintif – difficile à approcher – Fréquente marécages, côtes vaseuses – Nids groupés. En vol, cou replié en S.



Ardea purpurea Linné.


Famille Ardeidæ.

Rencontré dans toute l'île entre 0 et 1.800 mètres d'altitude.

Espèces européenne, africaine et asiatique.


Le Héron Cendré

Nom (s) malgache (s) — Vana
Langoromavo



Oiseau de grande taille – longueur : 1 mètre – plumage gris, blanc et noir – long bec, droit et conique – cou long, flexible – pattes longues et grêles – Sexes semblables.

Aquatique – se nourrit surtout de poissons – Vit le plus souvent solitaire mais niche en groupe. Vole avec cou replié en S.



Ardea cinerea Linné.

Famille Ardeidæ.

Se rencontre dans toute l'île, Hauts-Plateaux exceptés.

Espèce répandue dans tout l'Ancien Monde.

La Grande Aigrette

Nom (s) malgache (s) — Vanofotsy
Langorofotsy




Oiseau entièrement blanc – haut sur pattes – bec fort, jaune – pattes noires – 90 centimètres de long.

En plumage de noces : bec noir, pattes noires – plumes de la poitrine et du dos, longues, effilées : « aigrettes ».

Sexes semblables.

Niche en colonies avec d'autres Ardeidés. Se nourrit de poissons, batraciens, mollusques d'eau douce.



Egretta alba melanorhyncha (Wagler).


Famille Ardeidæ.

Peu commune mais rencontrée dans toute l'île.

Large répartition dans le monde.


L'Aigrette Dimorphe

Nom (s) malgache (s) — Vanofotsy
Fotsy elatra
Vano mainty
Kilandry be



65 centimètres de long – 2 formes : entièrement blanche – gris foncé avec marques blanches à la gorge et aux ailes – rencontrées parfois ensemble – Haut sur pattes – cou long, flexible – pattes noires, doigts jaunes – bec noir, mince et pointu – vole avec cou replié en S – en plumage de noces : plumes longues, effilées sur la tête et sur le dos – Sexes semblables.

Par couple ou petits groupes – marais, lacs, littoral marin – se nourrissent de poissons, insectes et larves aquatiques, crustacés – Nids groupés, souvent avec autres Ardeidés.



Egretta dimorpha Hartert.

Famille Ardeidæ.


Existe dans toute l'île.

Forme malgache de l'Aigrette garzette existant dans les régions tempérées et tropicales.

Oiseau intégralement protégé.


Le Héron Ardoisé

Nom (s) malgache (s) — Lomba komba
Salobokomana



55 centimètres de long — plumage gris bleu foncé — bec et pattes noirs — doigts jaune orangé — longues plumes effilées sur tête, cou, dos, toute l'année — pattes grêles — cou long.

Vit en zones marécageuses — se nourrit de poissons, insectes et larves aquatiques — Vole avec cou replié en S — Nids groupés, souvent avec autres Ardeidés.



Melanophoyx ardesiaca (Wagler).


Famille Ardeidæ.

Rencontré dans toute l'île mais surtout moitié Nord.

Existe en Afrique tropicale.


Le Héron Garde-Boeufs ou Fausse Aigrette

Nom (s) malgache (s) — Vorompotsy



Héron de petite taille – 50 centimètres de long – plumage blanc, bec jaune – en plumage de noces, longues plumes roux jaunâtre sur la tête, le cou, le dos – Sexes semblables. Se rassemblent, de nuit, en dortoirs et en période de nidification (décembre à mars).

Essentiellement insectivore – Intégralement protégé : joue un rôle très utile pour l'agriculture.



Bubulcus ibis (Linné).

Famille Ardeidæ.

Existe dans toute l'Ile, entre 0 et 1.800 mètres partout où il y a des bovins.

Existe dans toutes les zones tropicales d'Afrique et d'Asie.

La Spatule Africaine

Nom (s) malgache (s) — Sotro sony
Sotro vava
Vorondroko
Fangadiambava



d'après L. Bertin

Grand oiseau blanc (longueur 90 centimètres).


Bec caractéristique, en forme de spatule – face et gorge nues.

Sexes semblables.

Vit près des rivières, des marais, des rizières, en petits groupes.

Se nourrit de poissons, de larves, de batraciens.

Oiseau craintif – difficile à approcher.



Platalea alba Scopoli.

Famille Plataleidae.

Nord et Ouest de l'île. Lac Alaotra.

Réandu dans la plus grande partie de l'Afrique.

Serait migrateur.


L'Ibis Falcinelle

Nom (s) malgache (s) — Voromainty

Renikato


Maranasoy

Fitosiny



55 centimètres de long – plumage brun avec reflets bronzés – bec noir, long, arqué – pattes brun foncé – Sexes semblables.

Vit au bord des lacs, des marais – Se nourrit de petits crustacés, poissons, batraciens, insectes, vers – Craintif – difficile à approcher – Vole cou allongé.



Plegadis falcinellus (Linné).

Famille Plataleidae.

Sous-famille Threskiornithinae.

Rencontré dans toute l'île, régions sèches du Sud exceptées.


Espèce cosmopolite : Sud Europe – Sud Asie – Afrique –
Australie – Est des Etats-Unis.

L'Ibis Sacré

Nom (s) malgache (s) — Voronosy

Sove


Fitily bengy



80 centimètres de long – plumage blanc, souvent marqué de noir aux ailes – tête et cou nus, noirs – rouges à l'époque des noces – bec noir, arqué – pattes brun foncé – Sexes semblables.

Vit par couple ou petites bandes – marécages, embouchures et littoral marin – cherche dans la vase : crustacés, vers, coquillages, insectes – vole cou allongé – peu farouche – vit bien en captivité.

Oiseau sacré de l'ancienne Egypte.



Threskiornis aethiopica Latham.

Famille *Plataleidae*.

Sous-famille *Threskiornithinae*.

Ouest et Sud-Ouest de l'île – à proximité de la mer.

Existe dans toute l'Afrique – en Asie orientale – en Australie.

L'Ibis Huppé

ou

Ibis à Cimier

Nom (s) malgache (s) — Akohoala
Akolahinala



d'après A. Grandidier


Oiseau de la taille d'un coq – plumage brun, blanc et noir.

Pattes rouges – Crête de plumes sur la tête, de coloration vert métallique.

Vit en forêts, dans les régions humides, marécageuses.

Se nourrit d'insectes, larves, vers. Se perche dans les arbres pour la nuit.

Nidification en septembre-octobre -- nid sur arbres – ponte en général de 2 œufs.



Lophotibis cristata Boddært.

Famille Plataleidæ.

Sous-famille Threskiornitidæ.

N'existe qu'à Madagascar.

Intégralement protégé.

Forêts de l'Est, de l'Ouest et du Nord-Ouest de l'île.

Le Flamant Rose

Nom (s) malgache (s) — Gagaoa



d'après O. Austin & A. Singer

Grande taille : 140 centimètres de long. Très haut sur pattes – Très long cou.


Bec caractéristique, rose à la base, à extrémité noire.

Plumage blanc teinté de rose – ailes rouge et noir – Pattes roses, palmées – Vol caractéristique, en ligne.

Souvent en compagnie du petit Flamant, en colonies de très nombreux individus.

Pas de nidification connue à Madagascar.

Nourriture : petits animaux aquatiques, substances végétales.



Phoenicopterus ruber antiquorum Temminck.

Famille *Phoenicopteridæ*.


Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud : côtes, lacs.

Serait migrateur.

Répartition large, du Sud de l'Europe et de l'Asie, à l'Est et au Sud de l'Afrique.

Le Petit Flamant

Nom (s) malgache (s) — Samaka
Sambé



Longueur : 90 centimètres · Très haut sur pattes · Très long cou.


Bec caractéristique, brun rouge à la base, à extrémité noire.

Plumage blanc teinté de rose – ailes rouge et noir – Pattes rouges, palmées – Vol caractéristique, en ligne

Vivent en colonies, souvent en compagnie du Flamant rose – semblent moins nombreux que ceux-ci.

Pas de nidification connue à Madagascar.

Nourriture de petits animaux aquatiques et de substances végétales.



Phaeniconaias minor (Geoffroy).

Famille Phaenicopteridæ.


Ouest et Sud-Ouest : côtes, lacs.

Sera migrateur.

Existe également : Nord-Ouest de l'Inde – Est et Sud de l'Afrique.

Le Canard à Bosse ou Sarcidiorne à Crête


Nom (s) malgache (s) — Arosy
Angongo
Tsivongo



Oiseau gibier — Mâle : longueur de 70 centimètres — plumage : noir à reflets mordorés, blanc tacheté de noir — Caroncule noirâtre sur le bec en période de reproduction. Femelle : longueur de 60 centimètres — plumage brun et noir tacheté de blanc — pas de caroncule — pattes noirâtres, palmées — bec noirâtre.

Par bandes de 5 à 6 oiseaux dans les régions marécageuses, rizières, étangs. Vol puissant.

Se nourrit de graines de plantes aquatiques, de riz, d'insectes, de mollusques.



Sarkidiornis melanotos (Pennant).


Famille Anatidæ.

Rencontré dans toute l'île.

Existe en Afrique noire, en Inde.

La Sarcelle Naine

Nom (s) malgache (s) — Fiamboa
Maroampinga
Vorontsara
Voronandriana




d'après GRANDIER

P Randriamanantsoa

Oiseau gibier - 34 à 35 centimètres de longueur - plumage coloré : vert, brun roux, blanc - miroir blanc sur l'aile - bec jaune vif à pointe noire - pattes brunes palmées - Femelle moins colorée.

Petits groupes de 5 à 6 oiseaux sur étangs et lacs couverts de végétation - Farouche, très actif - nage et plonge avec aisance - vol rapide.

Se nourrit de graines de plantes aquatiques, d'insectes, de larves.



Nettapus auritus (Boddært).


Famille Anatidæ.

Existe dans toute l'île mais plus commun dans l'Ouest.

Egalement en Afrique noire.

Le Dendrocygne Veuf ou Canard Maragnon

Nom (s) malgache (s) — Vivy
Tsiriry




48 centimètres de long – plumage brun, ventre noir – tête noire et blanche – bec noir, pattes grises palmées – Sexes semblables.

Oiseau gibier – nage et plonge avec facilité – Souvent en groupes de plusieurs centaines sur lagunes, marais, rivières – Cri : sifflement caractéristique.

Se nourrit de graines, d'insectes, mollusques, crustacés, petits poissons – dégâts aux semis et récoltes de riz.

Nidification en novembre et avril.



Dendrocygna viduata (Linné).

Famille Anatidæ.

Rencontré dans toute l'île.


Existe en Afrique noire, en Amérique tropicale.

Le Dendrocygne Fauve

ou

Canard siffleur


Nom (s) malgache (s) — Tahia
Etsoa



47 à 48 centimètres de long – plumage brun roux – bec gris – pattes grises, palmées – Sexes semblables. Oiseau gibier – nage et plonge avec facilité – Vit en petits groupes sur les lacs – Cri : sifflement caractéristique.

Se nourrit de graines, d'insectes et larves aquatiques, de poissons – dégâts aux semis et récoltes de riz.

Nidification en novembre et avril.




Dendrocygna fulva (Gmelin).

Famille *Anatidæ*.

Rencontré dans l'Est et l'Ouest mais jamais très fréquent. Existe en Amérique tropicale, en Afrique du Sud, Inde, Ceylan, Birmanie.

La Bécassine


Nom (s) malgache (s) — Kitantano
Harakarata
Kekakeka



D'après O. Austin - A. Singer

Oiseau gibier – environ 40 centimètres de longueur – plumage noirâtre tacheté de gris et de roux – ventre blanc – pattes noirâtres – bec noir, long et droit – Sexes semblables.

Vol caractéristique – vit solitaire – fréquente les petits étangs, marais, rizières – Se nourrit de vers, larves, insectes aquatiques – Reproduction en juillet-août.



Capella macrodactyla Bonaparte.


Famille Charadriidæ.

Assez commune sur le versant Est entre 800 et 1.500 mètres d'altitude.

Même genre qu'en Europe et Afrique de l'Est.

La Rhynchée ou Bécassine Peinte


Nom (s) malgache (s) — Ravoravo
Salaly
Viko viko



d'après O. AUSTIN A. SINGER

Oiseau gibier -- environ 30 centimètres de longueur -- plumage marqué de noir, gris et roux -- dessous blanc --
Bec noir -- pattes grises -- Femelle plus grande, plus colorée que le mâle -- laisse au mâle soins, incubation
et élevage jeunes.

Vit par petits groupes de 3 à 6 dans marécages -- Difficile à approcher -- Vol lourd -- cri particulier -- Se nourrit
de larves, vers, insectes aquatiques.



Rostratula benghalensis Linné.

Famille *Charadriidæ*.

Assez commune Est et Ouest.

Existe dans toutes les zones tropicales de l'Ancien Monde.

La Poule d'eau

Nom (s) malgache (s) — Akohondrano

Arataka


Hoitiky



36 centimètres de long – plumage gris vert – flancs rayés de blanc – plaque frontale et base bec, rouges – pointe bec jaune – pattes jaune vert – doigts longs – Sexes semblables.

Le plus souvent par couple – marais et étangs – nage en hochant la tête – pour s'envoler, court à la surface de l'eau – vole bas, pattes pendantes.

Se nourrit de plantes et insectes aquatiques – Assez farouche – cri perçant.



Gallinula chloropus Temminck.


Famille Rallidæ.

Genre cosmopolite.

Assez commun dans toute l'île.

La Poule Sultane ou Porphyrion à dos vert


Nom (s) malgache (s) — Talevana
Vatry



46 centimètres de long – plumage vert cuivré dessus – bleu foncé dessous – joues et gorge bleu clair – Plaque frontale, bec et pattes rouges – doigts longs – Sexes semblables.

Le plus souvent par couple, dans la végétation aquatique – Vol lourd avec pattes pendantes – court rapidement parmi végétation – nage bien – court sur l'eau pour s'envoler.

Se nourrit de plantes et insectes aquatiques – Assez farouche – cri perçant.



Porphyrio madagascariensis (Latham).


Famille Rallidæ.

Genre cosmopolite.

Assez commun dans toute l'île.

La Perdrix

Nom (s) malgache (s) — traotrao
tsipoy
timpoy




Environ 31 centimètres de long — Plumage varié de brun, noir, blanc. Dimorphisme sexuel : mâle plus coloré que femelle.

Vit en régions herbeuses et de cultures, par compagnies de 3 à 12 oiseaux.

Se nourrit surtout de graines — Inquiété, court rapidement et vole au ras du sol sur courte distance — Crie en s'envolant.

Nid au sol.



Margaroperdix madagascariensis Scopoli.

Famille *Phasianidæ*.

Oiseau particulier à Madagascar.

Existe dans toute l'île, régions forêts exceptées.

Introduit à la Réunion.

La Pintade Mitrée

Nom (s) malgache (s) — Akanga
Tomena
Vitro




Environ 60 centimètres de long — Plumage noir avec taches blanches — tête nue, rouge vif et bleu, avec casque et caroncules.

Sexes semblables.

Vit en régions herbeuses ou lisières de forêts en bandes de 20 et plus — Se nourrit surtout de graines. Perche dans les arbres pour la nuit — Cri désagréable, caractéristique.

Fréquemment rencontrée à l'état domestique.



Numida mitrata Pallas.


Famille Phasianidæ.

Vraisemblablement importée de l'Afrique de l'Est.

Commune dans l'Est, mais surtout dans l'Ouest.


Le Pigeon Bleu ou Funingo Malgache

Nom (s) malgache (s) — Finaingo maitso
Fony
Voromeahilala



31 centimètres de longueur – plumage bleu foncé – queue rouge – tarses emplumés – pattes rouges – tour de l'œil rouge – bec gris et jaune – Sexes semblables.

Vit en régions boisées, par bandes de 3 à 12 – Arboricole et frugivore – Vol rapide – en repos au milieu du jour.



Alectrænas madagascariensis Linné.

Famille Treronidæ.

Espèce particulière à Madagascar.


Est et Ouest de l'île.

Le Pigeon Vert

ou

Colombar Austral


Nom (s) malgache (s) — Finaingo
 Voronadabo
 Voromanga
 Fitili - adabo



33 centimètres de longueur – plumage vert, gris, jaune et brun – tarses emplumés – pattes jaune orangé bec gris – Sexes semblables.

Vit en régions boisées, par bandes de 10 à 20 – Arboricole et frugivore – Vol rapide – en repos au milieu du jour – Roucoulement monotone.

Déplacements selon fructifications.



Vinago australis Linné.

Famille *Treronidæ*.


Espèce particulière à Madagascar.

Est, Nord et Ouest de l'île.

Introduit aux Comores.

La Tourterelle Peinte


Nom (s) malgache (s) — Domohina
Demoka



Environ 28 centimètres de long — queue de 11 centimètres — Dessus gris violet — dessous blanchâtre — Sexes semblables.

Commune en régions boisées — Se nourrit de graines — souvent par couples — Assez farouche — vol rapide — Roucoulement doux.

Parfois, dégâts aux cultures de riz.



Streptopelia picturata Temminck.


Famille Columbidæ.

Régions boisées de l'Est, de l'Ouest et du Sud — rare dans le Centre.

Existe dans la plupart des Iles de l'Océan Indien.

La Tourterelle du Cap ou Colombe à masque de fer

Nom (s) malgache (s) — Tsaleatoto
Katoto
Tsiazotononina



Environ 27 centimètres de long – queue de 11 centimètres – plumage gris – mâle : masque noir sur la face, la gorge et la poitrine, femelle : tache noire sur la poitrine – pattes rouges.

Fréquente les régions peu boisées, les champs en friche – Se nourrit de graines.

Peu farouche – rencontrée souvent, par couples, sur les routes, près des habitations.



Oena capensis Bangs.


Famille Columbidæ.

Genre commun à l'Afrique et à Madagascar.

Rencontré dans le Nord, l'Ouest, le Sud – Rare dans le Centre et l'Est.

Le Faucon Pèlerin

Nom (s) malgache (s) — Firasa
Voromahery




d'après O. Austin

Longueur : 40 à 45 centimètres – plumage gris brun foncé – dessous blanc roussâtre – ailes longues et pointues – queue longue – bec et serres robustes. Sexes semblables.

Rapace diurne, difficile à approcher – en régions découvertes – Vol rapide – se nourrit surtout d'oiseaux capturés au vol.

Emblème de la dynastie merina.



Falco peregrinus Hartlaub.


Famille *Falconidæ*.

Est et Ouest – peu fréquent.

Cosmopolite – espèce malgache : coloration foncée.


Le Faucon de Newton ou Crécerelle Malgache

Nom (s) malgache (s) — Hitikitika
Hitsikitsika



Longueur : 30 à 33 centimètres — plumage brun roux tacheté noir — poitrine roussâtre ou blanchâtre — tête grise — queue grise à bandes noires — pattes jaunes — ailes pointues — bec et serres robustes — Sexes semblables.

Rapace diurne — vole sur place — Fréquente les agglomérations humaines — peu farouche — Capture, « en piqué », insectes, petits vertébrés.



Falco newtoni (Gurney).

Famille Falconidæ.

Espèce particulière à Madagascar.

Commun partout, forêt dense exceptée.


Le Grand Perroquet

Nom (s) malgache (s) — Boloky

Vasa


Boeza

Koera



Oiseau arboricole, grimpeur — Longueur 50 centimètres — plumage brun noir — queue longue, carrée — pattes courtes — brun noir — bec robuste, noir ou noirâtre, crochu — peau nue jaunâtre autour œil.

Par petits groupes de 6 à 8 en régions boisées — actif surtout matin et soir — Frugivore et granivore — Dégâts au maïs, aux racines de manioc — Oiseau méfiant — très bruyant.



Coracopsis vasa (Shaw).

Famille Psittacidæ.

Forêts et plaines côtières de l'Est, de l'Ouest, Nord-Ouest et Sud.

Genre particulier à Madagascar.

Existe également Réunion, Anjouan.

Le Petit Perroquet


Nom (s) malgache (s) — Boloky
Koakia
Vazakakio
Koerakely



d'après Grandidier A.

Oiseau arboricole, grimpeur — Longueur 40 centimètres — plumage brun noir — ailes gris foncé — queue longue, carrée — pattes noires, courtes, robustes — bec fort, crochu, noirâtre — peau nue, rosée, autour œil.

Vit par petites bandes — souvent en forêt dense — jamais mélangé à *Coracopsis vasa* — frugivore et granivore — dégâts aux cultures : riz, maïs — Vol rapide mais peu soutenu — oiseau bruyant, cris variés.



Coracopsis nigra Linné.

Famille Psittacidæ.

Genre particulier à Madagascar, aux Comores, aux Seychelles.

Rencontré dans l'Est, le Nord, le Nord-Ouest, l'Ouest et le Sud-Ouest de l'île.

Le Coua Bleu

Nom (s) malgache (s) — Tish

Mariha


Tetso



Longueur : 50 centimètres – plumage bleu foncé – queue et pattes longues – pattes noires – bec noir, court, assez fort – peau nue autour œil : bleu – Sexes semblables.

Vit dans les arbres, en forêt dense – solitaire ou par couple – se nourrit d'insectes, lézards, fruits, œufs et oisillons.

Vol lourd – peu farouche – cris stridents.



Coua caerulea (Linné).


Famille Cuculidæ.

Forêts de l'Est et du Nord-Ouest (Sambirano).

Genre particulier à Madagascar.

Le Coua Huppé

Nom (s) malgache (s) — Tsivoka
Abosanga
Fandikalalana
Taitohaka




Longueur de 38 à 42 centimètres — dessus gris vert — ailes et queue bleu vert — dessous blanc roussâtre — queue et pattes longues — pattes gris foncé — Huppe grise — bec noir — peau nue autour œil : bleue — Sexes semblables.

Vit en régions boisées, dans les arbres, par couples ou groupes de 3 à 5.

Se nourrit d'insectes, mollusques, fruits, œufs et oisillons.

Vol lourd — hoche souvent la queue — cri monotone.

Trois sous-espèces selon répartition géographique.



Coua cristata (Linné).


Famille Cuculidæ.

Régions boisées du Nord, Nord-Ouest, Est, Ouest et Sud-Ouest.

Genre particulier à Madagascar.


Le Rollier

Nom (s) malgache (s) — Tsararaka
Voronkahaka
Fitilimbaratra



33 centimètres de long – plumage brun rouge dessus – violet dessous – ailes bleues – queue brune et bleue – bec fort, jaune – pattes jaune vert – Sexes semblables,

Insectivore – souvent perché bien en vue – vol lourd mais rapide – assez farouche – cri rauque – nid dans tronc arbre creux.



Eurystomus glaucurus (Muller).


Famille Coraciidæ.

Rencontré surtout Nord-Ouest et Ouest de l'île.

Migrateur d'Afrique – vient à Madagascar en saison des pluies : « oiseau du tonnerre ».


Le Brachyptérolle à longue queue

Nom (s) malgache (s) — Toloranto



Longueur de 36 à 42 centimètres – plumage marqué de gris, roux, blanc, noir et bleu clair – dessous blanc – femelle plus petite que mâle – queue étagée, très longue – ailes très courtes – bec brun épais – pattes gris bleu – Colorations semblables pour les 2 sexes.

Vit par petits groupes de 4 à 5 dans végétation d'Euphorbes et de Didiéracées, du Sud-Ouest – Vole mal – se nourrit d'insectes – nids creusés dans le sol.



Uratelornis chimæra Rothschild.

Famille Coraciadidæ.

Genre particulier à Madagascar.

Localisé au Sud-Ouest de l'île.

Le Guêpier


Nom (s) malgache (s) — Kirio kirioka



Longueur de 28 à 30 centimètres - plumage très coloré : vert, brun, blanc, bleu, noir - ailes longues, pointues - queue allongée - bec fin, mince (14 à 15 millimètres) un peu incurvé - pattes noirâtres - Sexes semblables.

Se nourrit d'insectes capturés au vol, hyménoptères en particulier - vol gracieux - cri caractéristique - nid en galerie profonde, creusée dans les berges - Vit en groupes en régions boisées - rare en forêt dense.

Déplacements locaux saisonniers.



Merops superciliosus Linné.

Famille Meropidæ.

Espèce particulière à Madagascar.

Existe dans toute l'île.

Le Martin-Pêcheur

Nom (s) malgache (s) — Vintsy




d'après A. Grandidier

Oiseau de petite taille (16 centimètres) – plumage roux et bleu brillant – bec droit et allongé.

Vit près des eaux calmes – Se nourrit de poissons, de grenouilles, de larves aquatiques.

Reproduction de septembre à mars – Nid creusé dans la berge verticale d'un cours d'eau.

Sexes semblables.




Corythornis vintsioides (Eyndoux et Gervais).

Famille Alcedinidæ.

Existe dans toute l'île – au bord des étangs ou des cours d'eau calmes.

Le Martin-Chasseur

Nom (s) malgache (s) — Vintsi-ala




d'après A. Grandidier

Oiseau de petite taille (14 centimètres) – plumage roux brillant et blanc – bec et pattes rouges.

Vit dans les sous-bois où il se nourrit de petits insectes, d'araignées, de grenouilles.

Reproduction d'octobre à janvier – Nid creusé dans un talus de sentier forestier. Sexes semblables.



Ispidina madagascariensis (Linné).

Famille Alcedinidæ.

Oiseau particulier à Madagascar.


Rencontré uniquement en régions boisées de l'Est, du Nord et du Nord-Ouest de l'île.

La Huppe

Nom (s) malgache (s) — Takodara

Barao

Beravo



Longueur de 32 centimètres — plumage roux pâle et noir — dessous beige rosé — queue longue, noire et, blanche — grande huppe érectile — bec mince, légèrement arqué — pattes noirâtres — femelle : taille plus petite teintes moins vives.

Vivent par 2 ou 3 en régions découvertes — consomment insectes, vers, larves — vol rapide mais court — assez farouche — nid dans arbre creux.



Upupa epops Linné.

Famille *Upupidæ*.

Espèce commune à l'Ancien Monde.
Race particulière à Madagascar.

Ouest et Sud de l'île — Rare dans l'Est.


Le Drongo ou Veuve

Nom (s) malgache (s) — Ndovy
Drongo
Railovy
Railomba



Longueur de 26 centimètres — plumage noir brillant — huppe dressée sur le front — queue longue, échancrée — ailes longues — pattes noires, courtes, robustes — bec fort, légèrement crochu — Sexes semblables.

Généralement solitaire — se nourrit d'insectes capturés au vol — perché à découvert — vole bien — oiseau courageux, de caractère vindicatif — cris très variés.



Dicrurus forficatus Linné.

Famille *Dicruridæ*.


Espèce particulière à Madagascar et aux Comores.

Seul représentant de la famille.

Rencontré dans toutes les régions boisées de l'île.

L'Artamie à tête blanche

Nom (s) malgache (s) — Tsetseky
Remavo




Oiseau arboricole — Longueur : 20 centimètres — plumage blanc et noir — bec gris, court et épais, à pointe crochue — pattes gris bleu.

Sexes semblables.

Vit par petites bandes bruyantes de 5 à 10, au faite des arbres — se nourrit d'insectes, de lézards — Vol rapide.

Deux sous-espèces : une de l'Est — une de l'Ouest et du Sud.



Artamella viridis Muller.

Famille Vangidæ.

Forêts de l'Est, du Nord-Ouest (Sambirano) — Régions boisées de l'Ouest et du Sud.

Famille particulière à Madagascar.

Le Vanga Ecorcheur

Nom (s) malgache (s) — Vanga

Voromaren'y


Vorobanga



Oiseau arboricole — Longueur : 25 centimètres — plumage blanc et noir — bec noir, fort — pattes grises — femelle plus terne.

Vit isolé ou par couple dans forêts et bois — se nourrit de petits reptiles, batraciens, insectes — Vol rapide — Sifflement aigu caractéristique.

Deux sous-espèces dont une particulière au Sud-Ouest.



Vanga curvirostris Linné.


Famille Vangidæ.

Forêts de l'Est — Régions boisées de l'Ouest, du Sud-Ouest — mangrove de la côte Nord-Ouest.

Famille particulière à Madagascar.

L'Eurycère de Prévost


Nom (s) malgache (s) — Tsingetrike
Siketrike



d'après A. GRANDIER

Oiseau arboricole — Longueur : 31 centimètres — plumage noir et roux — bec bleu, volumineux — pattes noires — femelle plus petite.

Vit en grande forêt par petits groupes de 5 à 10 — Vol lourd — Se nourrit d'insectes, de petits vertébrés.



Euryceros prevostii Lesson.


Famille Vangidæ.

Forêts du Nord-Est de l'île.

- Famille particulière à Madagascar.


La Falculie Mantelée

Nom (s) malgache (s) — Voronjaza
Fitolintsaiiky



Oiseau arboricole — Longueur : 32 centimètres — plumage noir et blanc — grand bec recourbé vers le bas — bec et pattes gris — sexes semblables.

Vit par bandes de 25 et plus — se nourrit d'insectes — peu farouche — cris variés, ressemblant parfois à cri jeune enfant — vol lourd.



Falcula palliata l. Geoffroy.


Famille Vangidæ.

Régions boisées Ouest et Sud — mangrove Nord-Ouest —
Savanes boisées Nord.

Famille particulière à Madagascar.

Le Zosterops ou Oiseau à lunettes

Nom (s) malgache (s) — Sabery
Tsaramaso
Ramanjerika




d'après O. AUSTIN A. SINGER

P. Rondriamanantsoa

Oiseau de petite taille — 11 centimètres de long — dessus vert-jaune et brun — dessous gris clair et jaune — cercle de plumes blanches autour de l'œil. Bec fin — pattes courtes, noirâtres — Sexes semblables.

Vit en bandes, souvent avec autres oiseaux, dans arbres et buissons — toujours en mouvement — vol vif mais peu soutenu — se nourrit d'insectes, fruits, pollen — petit cri continu — peu farouche.



Zosterops maderaspatana Linné.

Famille Zosteropidæ.


Espèce particulière à Madagascar et aux Comores.

Seul représentant de la famille.

Rencontré dans toutes les régions boisées de l'île.


Le Foudi Rouge ou Tisserin Ecarlate

Nom (s) malgache (s) — Fody
Fodimena
Fodimanta



14 centimètres de longueur — mâle en noces : plumage rouge et brun, bec noir — femelle et mâle en éclipse : dessus brun clair, tacheté — dessous gris — bec brun — pattes gris rose.

Vit en régions de cultures, en groupes plus ou moins importants — insectivore mais surtout granivore — cause parfois dégâts importants aux rizières — Nid de fibres entrelacées.



Foudia madagascariensis Brisson.

Famille Ploceidæ.

Sous-famille Ploceinæ.


Espèce particulière à Madagascar.

Régions découvertes de l'île.

Introduit aux Seychelles. Réunion, Maurice, Comores.

Le Foudi Sakalave ou Tisserin Sakalave

Nom (s) malgache (s) — Folisay
Draky




d'après A. GRANDIDIER

Mâle : 15 centimètres long – plumage brun sombre, dessous gris – tête jaune.

Femelle : 14 centimètres long – entièrement brun clair – pattes roses, bec gris.

Vivent en groupes parfois importants en savanes et régions peu boisées – insectivores mais surtout granivores – causent dégâts au riz à maturité – nids groupés, suspendus, avec tunnel d'entrée – proche des villages.

2 sous-espèces suivant répartition géographique.



Foudia sakalava Hartlaub.

Famille *Ploceidæ*.

Sous-famille *Ploceinæ*.

Espèce particulière à Madagascar.

Toute la côte occidentale de l'île.