

REVISIONS des ORCHIDEES de NOUVELLE CALEDONIE & DEPENDANCES

GENRE ACIANTHUS E. BR.

par

J. HOOK

Centre ORSTOM de NOUMEA

MAI 1970.

B 6306

Plantes terrestres glabres.

Tubercules glanduleux,
souterrains.

Tige mesurant de 1 à 50 cm de haut,
dressé,
droite,
ou échancreuse,
grêle,
± rombe,
émittant des tubercules,
ou des stolons tuberculifères au-dessus
du tubercule,

non ramifiée en pseudostolons,
à plusieurs articles,
verte,

± pourprée,
à une seule feuille.

Feuille mesurant de 1 à 40 cm de long,
solitaire,
insérée à mi-hauteur de la tige,
sessile,
non articulée,
cordiforme,
entière,
ou lobée,
étalée,
mince,
± plissée,
présente à la floraison,
verte,
± pourprée.

Inflorescence en grappe simple,
± lâche,
terminale,
dressée,

ayant de 1 à 10 fleurs.

Insettes égalant,
ou dépassant,
ou non l'ovaire.

Fleurs de 1 à 4 cm de diamètre,
dressées,
étalées,
récupindées,
grêles,
rose ± pourprées,
plus souvent blanc-verdâtre.

Épale impair libre,
dressée,
ou en/encore,
± lancéolée,
aristée,
ou linéaire.

Épales latérales libres,
étalées,
généralement plus petite que
le sépale impair,
lancéolées,
aristées,
ou linéaires.

Pétales libres,
étalés,
généralement plus petite que les sépales
± obliques,
lancéolés,
ou linéaires,
parfois absents.

Labelle libre,
étalé,
généralement de la taille des pétales,
ou un peu plus grand,
sessile,
± onguculé,
non articulé,
indivis,
ou trilobé,
appendiculé à la base,
ou non appendiculé,
non éperonné,
lisse,
ou finement papilleux.

Gynostème dressé,
recourbé à mi-hauteur,
ou du sommet,
grêle,
sans pied,
appendiculé à la base,
ou à mi-hauteur,
ou non appendiculé,
à sommet généralement épaissi.

Anthère large,
dressée,
à 2 loges à l'axe, les valves externes (?)
à connectif prolongé parfois en une
courte pointe.

Pollinies granuleuses,
au nombre de 6,
réunies par 4 par loge.

Ovaire mesurant de 1 à 10 cm de long,
± cylindrique,
ou ± en massue,
± brièvement pédonculé,
ou sessile.

- 1 a - Feuille à 7 lobes, le médian plus grand, oblong ou rhomboïde-pointu, les latéraux canaliculés-obtus denticulés, 12 cm de haut. Fleur ? A. heptadactylus BRONZ.
- 1 b - Feuille entière ou à 4-7 lobes ± développées et oblonges ± pointues = (2)
- 2 a - Pétales absents, feuille entière, bractées n'égalant pas l'ovaire, sépale impair en casque et caudé, labelle indivis, gynostème à bords anguleux, plus de 30 cm de haut. A. stenotylus REICHB. f.
- 2 b - Pétales présents = (3)
- 3 a - Pétales linéaires-filiformes, ± pointus et plus courts que les sépales,
3 a' - Labelle indivis, arrondi-pointu au sommet, rétréci au dessus de la base, feuille entière ou lobée. 4-5 fleurs de 1 cm de diamètre.
Gynostème recourbé, 12 - 14 cm de haut. A. confusus WILLD.
- 3 b' - Labelle indivis, pointu au sommet.
- 3 a'' - Bractées égalant ou dépassant l'ovaire.
- 3 a''' - Feuille à ± 7 lobes, gynostème un peu épaissi au sommet, 15-20 cm de haut, 3-5 fleurs, de 0,5 cm de diamètre. A. macrochaetus SCHUM.
- 3 b'' - Feuille entière, gynostème épaissi à la base et au sommet, 10-15 cm de haut, 3-10 fleurs de 1 cm de diamètre. A. elongatus REICHB. f.
- 3 b - Bractées plus courtes que l'ovaire, feuille entière, gynostème un peu épaissi au sommet, 10-15 cm de haut, 3-5 fleurs de 1 cm de diamètre. A. tenuilobus SCHUM.
- 3 b - Pétales oblong-lancolés, ± falciformes ou caudés, plus courts ou égalant les sépales = (4)
- 4 a - Labelle indivis
4 a' - arrondi au sommet et appendiculé à la base, feuille entière, bractées n'égalant pas l'ovaire, gynostème un peu ailé à la base, 15-20 cm de haut, 2-5 fleurs de 1,5 cm de diamètre. A. multiflora SCHUM.
- 4 b' - aigu au sommet,
4 a'' - ovale, puis brusquement pointu, appendiculé à la base, feuille entière, bractées n'égalant pas l'ovaire, gynostème court, 10 cm de haut, 3-7 fleurs de 1,5 cm de diamètre. A. ovalis SCHUM.
- 4 b'' - étroitement cordiforme ou lancolé-aigu
4 a''' - liège, feuille à 4 lobes, bractées n'égalant pas l'ovaire, gynostème mince, 25 cm de haut, 4-5 fleurs de 2 cm de diamètre. A. culiciferus REICHB.
- 4 b''' - avec un callus basal et à sommet finement papilleux, feuille à 3-5 lobes, bractées n'égalant pas l'ovaire, gynostème mince et à sommet dilaté, 15-20 cm de haut, 1-5 fleurs de 1 cm de diamètre. A. tenuilobus SCHUM.
- 4 b - Labelle tri-lobé = (5)
- 5 a - Lobes latéraux arrondis
5 a' - lobe médian oblong-obtus, feuille à ± 5 lobes, bractées n'égalant pas l'ovaire, gynostème un peu épaissi à mi-hauteur, 5-10 cm de haut, 1-4 fleurs de 1,5 cm de diamètre. A. ovalis REICHB. f. KILL et BRONZ.
- 5 b' - lobe médian pointu
5 a'' - gynostème sans appendice et ailé sur les bords et au sommet, feuilles à 5 lobes, bractées n'égalant pas l'ovaire, 7 cm de haut, 2 fleurs de 3 cm de diamètre A. ovatus REICHB.
- 5 b'' - gynostème bi-appendiculé à mi-hauteur, feuille à 5-7 lobes teintés de rouge, bractées n'égalant pas l'ovaire, 5-15 cm de haut, 2 fleurs de 1,5 cm de diamètre. A. corniculatus REICHB.
- 5 b - Lobes latéraux triangulaires = (6)
- 6 a - libres, feuille à 5-6 lobes teintés de rouge, bractées dépassant l'ovaire, gynostème avec un appendice coralliforme à mi-hauteur, 10-15 cm de haut, 3-4 fleurs de 2-3 cm de diamètre. A. bracteatus REICHB.
- 6 b - soudés sur toute leur longueur, feuille entière, bractées égalent l'ovaire, gynostème sans appendice, 3-5 cm de haut, 1 (?) fleur de 1,5 cm de diamètre. A. schenochilus REICHB.

Lincoln 221 (1877) 36

Viellard, sans localité, ni
numéro.

Tige pouvant dépasser 20 cm de haut,

Feuille cordiforme ou arrondie - oblongue,

pointue,

entière.

Inflorescence bi - planiflore.

Bractées n'égalant pas l'ovaire,

triangulaires,

pointues.

Épale impair dressé,

recurvé en croque,

ovale,

pourvu d'un flos dominant le limbe.

Épales latérales égalant le épale impair ou un peu plus petite,

à bords indurés, l'inférieur étant obtus - anguleux à la base, puis plus aigu.
(falculiformes ?)

Pétales absents.

Labelle indivise,

cordiforme,

oblong,

pointu,

concave,

plié au 2,

à sommet recurvé.

Gynostème semi-cylindrique,

à bords anguleux au dessus de la base.

Journ. Linn. Soc.
X L V (1901) 234
Rendle n° 621

- Stige mesurant de 10 à 15 cm de haut,
dressée,
teintée de pourpre.
Feuille mesurant jusqu'à 1,2 cm de long,
à 7 lobes.
Lobes elliptiques ou pointus,
teintés de pourpre.
Inflorescence ayant 2-4 fleurs.
Bractées mesurant de 1 à 1,7 cm de long,
dépassant l'ovaire,
parmi les plus grandes du genre,
falcées,
elliptiques,
pointues,
fleurs mesurant 2-4 cm de diamètre,
rouge foncé terne.
Sépales inférieurs mesurant 1 - 2 cm de long,
linéaires,
étroits,
cunéés au sommet,
à 1 nervure.
Sépales latéraux mesurant 1 - 2 cm de long,
linéaires,
étroits,
cunéés au sommet,
à 1 nervure.
Pétales mesurant 2 - 15 cm de long,
linéolés.
Petale mesurant 1,2 cm de long,
bi-appendiculé à la base (?),
tri-lobé.
Lobes latéraux mesurant 2 cm de long,
triangulaires,
pointus.
Lobe médian mesurant 4 cm de long,
triangulaire,
pointu.
Gynostème mesurant 5 cm de long,
appendiculé à mi-hauteur sur sa face antérieure,
apexice cordiforme,
pointu,
déprié en son milieu.
Ovaire mesurant jusqu'à 1 cm de long,
indivisément pédonculé.
Mont 123 : forêt néphélienne sur serpentine, 1 000 m.

Bull. Soc. Bot. G France

L X I X (1929) 506

Vieillard	n° 1 516	} sous le nom d'Acianthus macroglossus
Gribs	n° 525	
Franc	n° 1 801 } pro	
	n° 2 605 } parte	
McKee	n° 16 640	

Tige mesurant de 12 à 14 cm de haut,

dressée,

très grêle,

nue,

ou le plus souvent feuillée.

Feuille mesurant de 1 à 2,5 cm de long,

ovale,

pointue,

le plus souvent à 4-5 lobes,

bien distincts,

elliptiques,

à sommet obtus,

allongé,

ou apiculé.

Inflorescence à 4-5 fleurs.

Bractées plus petites que la moitié de la longueur de l'ovaire et du pédicelle,
lancéolées.

Fleur mesurant environ 1 cm de diamètre.

Sépale impair mesurant 4-5 mm de long,

linéaire,

filiforme.

Sépales latéraux mesurant 4 mm de long,

linéaires,

filiformes.

Pétales mesurant 2-3 mm de long,

linéaires,

filiformes.

Labelle mesurant 4-5 mm de long sur 2 - 3,5 mm de large,

à base un peu cordiforme,

puis rétréci au dessus de la base,

large,

à sommet arrondi,

acuminé.

Gynostème mesurant à peine 2 mm de long,

recourbé.

Ovaire mesurant environ 3 mm de long.

Malais, Pouéta, Prony.

Pentes du Mont Keala au dessus de Gomen, maquis serpentineux, 300-500 m, avril.

Journ. Linn. Soc. Bot.
X L V (1921) 255
Rendle n° 1712

Tige mesurant de 6 à 16 cm de haut,
dressée,
teintée de pourpre.

Feuille mesurant jusqu'à 1,2 cm de long,
à 5 - 7 lobes.

Lobes oblongs,
pointus,
teintés de pourpre.

Inflorescence à 2 fleurs.

Bractées mesurant environ 2 mm de long,
n'égayant pas l'ovaire,
petites,
larges,
ovales,
pointues.

Fleurs mesurant environ 1,5 cm de diamètre.

Sépale impair mesurant 2 mm de long,
linéaire,
à sommet pointu.

Sépales latéraux mesurant à peine 7 mm de long,
linéaires,
à sommet pointu.

Pétales mesurant 4 mm de long,
obliques,
elliptiques,
obtus.

Labelle mesurant 5 mm de long sur 3 de large sous le sommet,
étroitement bi-appendiculé à la base,
tri-lobé.

Lobes latéraux courts,
arrondis.

Lobe médian ovale,
triangulaire,
pointu.

Gynostème mesurant 4 mm de long,
appendiculé à mi-hauteur sur sa face antérieure.
Appendice dressé et bi-ailé.

Ovaire mesurant 2 mm de long;
cylindrique,
pédicellé.

IGHANBI : Forêt humide sur gneiss, 900 m, Août.

Journ. linn. Soc. Bot.
X L V (1921) 294
Hendie n° 1 043

Tige mesurant environ 25 cm de haut,
dressée,
sinueuse.
Feuille mesurant de 5 à 10 mm de long,
à 4 lobes elliptiques,
pointus.
Inflorescence à 4-5 fleurs.
Bractées n'égalant pas l'ovaire,
mesurant de 2 à 3 mm de long,
petites.
Fleur mesurant moins de 2 cm de diamètre.
Sépale latéral mesurant 10 mm de long,
étroit,
linéaire,
atténué au sommet.
Sépales latéraux mesurant 9 mm de long,
étroits,
linéaires,
atténués au sommet.
Pétales mesurant 4 mm de long,
obliques,
elliptiques,
brusquement pointus,
à 1 nervure.
Labellum mesurant 7 mm de long sur 1,5 mm de large,
indivis,
atténué au pointu.
Gynostème mesurant 4 mm de long.
Ovaire brièvement pédonculé.

Rivière BOUEN : parmi les feuilles mortes, les brindilles et l'humus dans la forêt à
Casuarina sur serpentine près de la rivière, 50 m ; Ind.

(Description de Schlechter : Engl. Jahrb. Bot. (1906) 39).

Vest. Bot. Zeitsch.
XXIV (1904) 209
Schlechter n° 1471

- Tige mesurant de 4 à 15 cm de haut,
dressée.
- Feuille mesurant de 2 à 10 cm de diamètre,
sub-orbulaire ou cordiforme,
lobes brièvement acuminés,
entière ou à 5 lobes profonds,
lobes arrondis ou un peu pointus.
- Inflorescence ayant de 1 à 4 fleurs.
- Bractées généralement plus courtes que l'ovaire,
lancéolées.
- Fleurs mesurant environ 2 cm de diamètre,
rouges.
- Épale inférieure mesurant 1.5 cm de long,
linéaire,
un peu atténué ou obtus au sommet.
- Épales latérales mesurant 1 cm de long,
obliques,
linguiformes,
obtus.
- Épales mesurant 1 cm de long,
sigmoïdes,
lancéolées.
- Labelle mesurant 1 cm de long,
bi-appendiculé à la base,
appendices obtus,
en croissant,
linguiformes,
trilobés.
- Lobes latéraux courts,
arrondis.
- Lobe médian un peu allongé,
oblong,
obtus.
- Gynostème mesurant environ 4 cm de long,
un peu épais à mi-hauteur.
- Ovaire mesurant environ 5 cm de long,
sub-cylindrique,
brièvement pédonculé.

District du Sud : dans l'intérieur des forêts aux endroits humides, sommet du Mont Kilo
1 250 m, octobre.

Description de Kruenzlin : Vierteljahrschr. Nat.
Ges. Zurich
LXXIV (1909) 27

Linnaea XL (1877) 96
Donati n° 115 (Ries)

Tige mesurant de 9 à 10 cm de haut,
Feuille mesurant de 1,2 à 2 cm de long sur 0 à 10 mm de large,
entière,
profondément cordiforme,
triangulaire,
pointue,
à bords légèrement retroussés.
Inflorescence ayant de 5 à 10 fleurs.
Bractées égales à l'ovaire.

Bractées inférieures mesurant 5 mm de long sur 4 de large,
longues,
ovales,
pointues,
à 5 nervures,
plus, de part et d'autre, une nervure inconnue.
Bractées supérieures beaucoup plus petites,
égales aussi à l'ovaire.

Fleurs mesurant environ 1 cm de diamètre.
Sépale impair mesurant 4 mm de long sur à peine 0,5 de large,
étroit,
linéaire.
Sépales latéraux mesurant 4 mm de long sur à peine 0,5 de large,
étroits,
linéaires.
Pétales mesurant 2 mm de long,
linéaires,
le quart supérieur plus étroit.

Labelle mesurant 3 mm de long sur environ 2 de large,
indivise,
large,
oblong,
pointue,
parcouru en son milieu par 3 lignes.
(Reichenbach filie : ovale, obliquement apiculé et toujours à gauche)
Gynostème un peu plus large à la base et au sommet.

Montagne : entrée de la forêt, etc.

Fleur verte et à extrémité du gynostème rouge.

Engl. Jahrb. Bot. (1900) 20
Schlechter n. 19 203

Stipe mesurant de 14 à 20 cm de haut,
droite ou sinuose.
Feuille mesurant de 1,5 à 2,5 cm de long sur 2 à 3,5 de large à la base,
entière,
ovale,
large,
profondément cordiforme,
pointue.
Inflorescence ayant de 2 à 5 fleurs.
bractées n'égalant pas l'ovaire,
oblongues,
ovales,
un peu obtuses.
Flower mesurant environ 1,5 cm de diamètre,
ronds.
Sépale impaire mesurant 6 mm de long,
lancéolé,
concave.
Sépales latéraux mesurant 7 mm de long,
obliques,
linéaires,
concaves.
Pétales mesurant 7 mm de long,
subcaliciformes,
larges,
oblongs,
pointus.
Lobes mesurant 2 mm de long sur 5 de large sous le corol,
linéaire,
obovale,
très obtus,
atténué à la base,
divergent à la base.
Appendices oblongs,
falqués.
Gynostème mesurant 5 mm de long,
à l'orbe un peu dilatée au dessus de la base.
Lobes mesurant 6 mm de long,
sensile,
cylindriques.

Région du Sud : entre les buissons sur les montagnes de Igayé, 400 m environ,
Yai.

Lecoute Hst. Syst.
10 (1 182) 121
Salomon 182 115

Tige mesurant 18 cm de haut.

Seuille mesurant environ 2 cm de long sur 1,5 de large,

divisée en 7 segments plus ou moins soudés à la base.

Segment médian mesurant 10 mm de long sur 5 de large,

oblong,

rhombale,

à sommet pointu,

de part et d'autre plus arrondi qu'anguleux.

Segments latéraux mesurant 4,5 mm de long sur 3 de large au sommet,

soudés à la base,

confus,

à sommet obtus,

bi ou tri-denticulés.

Inflorescence à 5 fleurs tournées du même côté (toujours ?).

Fleurs probablement petites.

(déjà fanées et réduites à des rudiments).

Bractées mesurant 3 mm de long sur 2 de large à la base,

ovales,

pointues.

Capitules de 5 mm de long sur 3 de diamètre.

Comet du Mont 182.

Engl. Jahrb. Bot. (1900) 40
Schlechter n° 14 682.

tige mesurant de 19 à 22 cm de haut,

droite ou sinuose.

Feuille mesurant 3 à 4 cm de long sur 2 à 2,5 au dessus de la base,

à contour ovale,

profondément cunifforme,

pointue,

5-7 lobes ± distincts.

Inflorescence ayant de 5 à 6 fleurs.

Bractées égales ou dépassant l'ovaire,

linéaires.

Fleurs pouvant dépasser 2,5 cm de diamètre,

unilatérales.

Sépale dorsal mesurant 2 cm de long,

très étroit,

linéaire.

Sépales latéraux mesurant 2 cm de long,

très étroits,

linéaires.

Labelle mesurant environ 1,5 cm de long et presque 7 cm de large à sa base,

indivise,

oblongues,

caulé - pointu au sommet,

à nervure médiane un peu épaisse.

Corolle mesurant 2 cm de long,

un peu épaissi au sommet.

Ovaire mesurant 7 cm de long,

gynécée,

sub-cylindrique.

Région du Sud : le long des ruisseaux dans les forêts des montagnes près de Rosta,
entre les pierres, environ 500 m d'altitude.

Journ. Linn. Soc. Bot.
A. L. V (1841) 294
Hendle n° 1700

Stige mesurant 7 cm de haut,

divisé.

Feuille mesurant 2,2 cm de diamètre,

à contour orbiculaire ou cordiforme,

à 5 lobes,

lobes arrondis,

pointus.

Inflorescence à 2 fleurs.

Bractées mesurant 4 à 6 mm de long,

n'étant pas l'ovaire,

ovales,

pointues.

Fleurs mesurant environ 2 cm de diamètre.

Épale inférieure mesurant 1,7 cm de long,

étroit,

linéaire,

un peu obtus au sommet.

Sépale latéral mesurant 1,4 cm de long,

étroit,

linéaire,

un peu obtus au sommet.

Pétales mesurant 1,1 cm de long,

obliques,

elliptiques,

saillants vers le haut,

à sommet coudé,

à 3 nervures.

Labelle mesurant 1,4 cm de long sur 2 mm de large au milieu,

à base linguiforme,

bi-appendiculée.

Trilobé.

Lobes latéraux un peu arrondis.

Lobe médian mesurant 2 mm de long,

étroit,

pointu.

Gynostème divergi à mi-hauteur,

allé sur les bords,

allé au sommet.

Ignambi : assez rare dans la forêt humide aux guais entre 700 et 1 000 m
Fleur blanc verdâtre teintée de pourpre, août.

Engl. Jahrb. botan. (1906) 40
Schlechter n° 15 002.

Stige mesurant à peine 10 cm de haut,

dressée,

plus ou moins sinuée.

Feuille mesurant de 4 à 7 cm de long sur 4 à 6 de large au dessus de la base,

ovale,

cordiforme,

pointue.

Inflorescence ayant de 2 à 7 fleurs.

Bractées n'égalant pas l'ovaire,

oblongues,

larges,

ovales,

pointues.

Fleurs mesurant environ 1,5 cm de diamètre,

pourpres,

jaunâtres.

Épale latérale mesurant à peine 6 mm de long,

étroit,

lancolé,

très pointu,

un peu concave.

Épale latérale mesurant environ 1 cm de long,

étroite,

lancéolée.

Pétales mesurant à peine 4 mm de long,

obliques,

lancolés,

très pointus.

Labelle mesurant 4 mm de long sur environ 2 de large à sa hauteur,

bilobé,

longement ongulé,

bi-ongulé à la base.

Appendices petits et en croissant,

lamelle brusquement ovale,

large,

puis à sommet très étroit,

pointu.

Synostème court pour le genre.

Antère grande.

Ovaire mesurant environ 3 mm de long,

sub-cylindrique,

à pilosité grêle.

Région du sud : entre les pierres dans la forêt de l'Inde à environ 100 m, novembre.

Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zurich

LXXIV (1909) = 97

Donati n° 614

Tige mesurant de 2 à 5 cm de haut.

Scuille mesurant de 7 à 10 mm de diamètre,

entière,

très large,

ovale,

presque orbiculaire,

très brièvement pointue.

Inflorescence uniflore (toujours ?),

mesurant de 1 à 1,5 cm de long.

Bractée mesurant 3 mm de long,

ou un peu plus courte,

égale à l'ovaire,

lancéolée.

Fleur mesurant environ 1,5 cm de diamètre.

Stépale impair mesurant 9 mm de long sur 1 de large,

linéaire,

longue ment et très finement pointu.

Stépales latéraux mesurant 5 mm de long sur 1 de large,

linéaires,

longue ment et très finement pointu.

Pétales mesurant 8 mm de long sur 2 de large, en dehors de la pointe,

linguiformes,

à nervure médiane se prolongeant en pointe filiforme.

Labellé mesurant environ 1 cm de long sur 5 mm de large sous le sommet,

à 3 nervures,

à base cunéiforme,

puis graduellement dilaté,

tri-lobé.

lobes latéraux presque triangulaires à leur base,

écuslé sur toute leur longueur,

lobe médian placé en avant.

Gynostème mesurant 5 mm de long,

à sommet relativement épais.

Mont Boghi : sous les broussailles à l'entrée de la forêt, 400 m, rare. Ind.

Engl. Jahrb. 2 & 3 I 2 (1906) 41
Schlechter n° 14 739

Tige mesurant de 10 à 15 cm de haut,

sinuose ou
plus ou moins droite.

Feuille mesurant de 6 à 12 cm de long sur 6 à 10 cm de large au dessus de la base,

entière,
large,
ovale,
profondément cordiforme,
brèvement pointue.

Inflorescence ayant de 2 à 5 fleurs.

Bractées environ deux fois plus courtes que l'ovaire,
lancéolées.

Fleurs mesurant environ 1 cm de diamètre,
pourpres.

Sépale impair mesurant 5 mm de long,
étroit,
linéaire,
pointu.

Sépales latéraux mesurant 5 mm de long,
un peu obliques à la base,
étroits,
linéaires,
pointus.

Pétales mesurant 6 mm de long,
étroits,
linéaires,
pointus.

Labelle mesurant 6 mm de long sur 3 de large au dessus du sommet,
indivise,
un peu rétréci vers la base,
large,
oblong,
brèvement pointu au sommet.

Gynostème mesurant 8 mm de long,
un peu épaté vers le sommet.

Ovaire mesurant 3 mm de long,
sub-cylindrique,
brèvement pélicellé.

Région du Cam : sur les rochers à l'ombre dans les forêts du Pic N'koudi au dessus
de Yehoué à environ 500, Septembre.

Engl. Jahrb. f. Bot. 12 (1906) 42
Schlechter n° 14700.

- Stige mesurant de 15 à 18 cm de haut,
dressée.
- Feuille mesurant de 8 à 10 cm de long,
cordiforme,
à 5-8 lobes.
Lobes très brièvement pointus.
- Inflorescence ayant de 1 à 3 fleurs.
- Bractées un peu plus courtes que l'ovaire,
ovales,
pointues.
- Fleurs mesurant environ 1 cm de diamètre.
- Stylis ligule mesurant 7 mm de long,
étroit,
linéaire,
pointu.
- Stylis latéraux mesurant 6 mm de long,
un peu obliques,
étroits,
linéaires,
pointus.
- Stylis mesurant 5 mm de long,
obliques,
elliptiques,
sub-oblongs,
pointus.
- Labelle mesurant 7 mm de long,
indivise,
à base munie d'un petit callus médian oblong,
ensuite un peu rétréci,
puis élargissant l'apex,
très finement papilleux.
- Gynostème à sommet dilaté.
- Anthère largement ovale,
brièvement pointue.
- Ovaire mesurant 5 mm de long, pédoncule inclus,
obtus,
brièvement pédonculé.

Région du Sud : sur les montagnes près de Yachoué, sur les rochers à l'ombre dans les
forêts à 500 m, septembre. Fleurs rouge-violet te ne.

SILVIA n° 19 175, 19 371, forêt du bois de Mai
n° 19 388, Mont Marboldt, 1 400 m.

C.S. ZIMMIG n° 90, plaine des lacs, campement 21

Acta Horti Gotoburgensis - Anno 1814 : 1

Gotaborg 1 931.

Le 1814 n° 1 939, comest du Mont 1814.