

Remarques taxinomiques sur les algues des Mares du Kanem (Tchad)

Par A. ILTIS (*).



A propos de deux des espèces nouvelles décrites (*Revue algologique, Nouvelle série*, t. 10 fasc. 2, pp. 172-6), on notera les remarques taxinomiques suivantes :

Scenedesmus retrospinus Iltis 1971.

Le Professeur T. HORTOBAGYI a eu l'amabilité de nous signaler que cette espèce avait été décrite des bassins piscicoles du Buzsak en Hongrie sous le nom de *S. coartatus* Hortobagyi (*Act. Bot. Acad. Scient. Hungaricae*, 1967, pp. 23-24, fig. 20 à 25) et qu'elle avait de plus été trouvée en URSS (Crimée) et figurée par KORCHIKOFF sous le nom erroné de *S. obliquus*. En Hongrie, elle a été récoltée dans des eaux d'un pH de 7,58 à 10,48. Notre espèce est donc mise en synonymie avec *S. coartatus* qui bénéficie de l'antériorité.

Surirella acanthophora Iltis 1971.

Cette dénomination ayant déjà été utilisée par GIFFEN (Diatomaceae I. *Beihefte zur Nova Hedwigia*, 1966, 21, pp. 145-146, fig. 92-95) pour la description d'une espèce récoltée dans la province du Cap en Afrique du Sud, l'espèce décrite du Kanem prend la nouvelle nomination de *Surirella pseudospinifera*.

(*) Hydrobiologiste. ORSTOM, B. P. 65, Fort-Lamy, Tchad.

25 JAN. 1974

O. R. S. T. C. M.

Collection de Référence

n° 6613 Hydrot