

La séro - surveillance du SIDA en Afrique.
REY J.L. *, SORO B.** , MERLIN M.*** , GATEFF C.***

*ORSTOM. 34032 Montpellier , **INSP/Abidjan , ***IMTSSA/Marseille.

La surveillance du SIDA/maladie est relativement facile et dépend beaucoup du système de déclaration des pays. La surveillance du SIDA/infection est beaucoup plus difficile, elle est pourtant primordiale pour connaître la situation sanitaire avant la déclaration de la maladie et prévoir des mesures de prévention de la transmission virale.


Le dépistage indiscriminé est inutile épidémiologiquement, coûteux et souvent néfaste sur le plan préventif.

Il est possible de dépister la séropositivité sur des sérums anonymes dans les banques de sang, dans les centres PMI/SMI si le dépistage des tréponématoses ou des anémies est pratiqué systématiquement et au niveau des laboratoires hospitaliers en se limitant à certains services sentinelles.

Il faut envisager également des actions de séro-surveillance sur des sujets identifiés dans les centres sentinelles (dispensaires MST, centres PMI, centres de récupération nutritionnelle ou de réhydratation orale) et par des enquêtes sur un échantillon représentatif de la population générale.

Dans tous les cas la confidentialité des résultats devra être rigoureusement garantie, le mode d'information des sujets étudiés à l'avance ainsi que l'utilisation des données.

**IV^e CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR LE SIDA ET LES CANCERS ASSOCIÉS EN AFRIQUE**
**IVth INTERNATIONAL CONFERENCE
ON AIDS AND ASSOCIATED CANCERS IN AFRICA**



18-20 Octobre 1989 – October 18-20, 1989
Marseille, France

**LIVRE DE RÉSUMÉS
ABSTRACT VOLUME**

ORSTOM Fonds Documentaire

N° : 34.127 ex 1

Cote : B

09 JUL. 1991

P49