

REFLEXIONS SUR DES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES D'INCIDENCES DU PALUDISME CLINIQUE ET DE LA SEROPREVALENCE VIH EN COTE D'IVOIRE

F.Veas*, A.Coulibaly**, B.Soro**, C.Brengues* et J.L.Rey*. ORSTOM BP 5045. 34032 Montpellier. **INSP BPV 47 Abidjan (Côte d'Ivoire)

Epidemiologie. Paludisme clinique. Chimio-résistance. VIH. Côte d'Ivoire

Depuis 1983 tous les diagnostics enregistrés dans la totalité des centres de santé du pays sont recueillis, centralisés et exploités à l'INSP d'Abidjan (3 500 000 diagnostics en 1987).

Cette exploitation a permis de montrer que l'incidence du paludisme chez l'adulte a augmenté régulièrement à partir de 1986, parallèlement à l'augmentation de la séroprévalence VIH dans la population générale et à l'apparition de la chimio-résistance de *P.falciparum*.

Les possibles relations entre l'aggravation de la situation concernant le paludisme et les deux facteurs évoqués plus haut sont discutés à partir d'observations faites dans différents hôpitaux et à partir des résultats d'une enquête séro-épidémiologique réalisée sur 400 adultes de zones rurales soumis à une chimioprophylaxie antimalarique contrôlée.